

Leptomerocoris antennatus Walk., Cat. Hem. Het., p. 145, 109¹).

Victoria, 2 spp.

Caput a supero visum pronoto fere $\frac{1}{4}$ brevius, latitudini frontis oculique unici fere aequa longum, a latere visum altitudine basali paullo longius, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ latio. Antennae articulo secundo margine basali pronoti parum longiore, apice clavato articulo primo paullulum graciliore, tertio secundo $\frac{5}{8}$ breviore, sat crasso, subcylindrico, quarto gracili, tertio $\frac{1}{3}$ breviore. Pronotum basi quam apice mox pone stricturam duplo latius, latitudine basali fere $\frac{2}{5}$ brevius, disco postico sublaevi, strictura apicali basi articuli secundi antennarum aequa crassa. Membrana obscure fusca, venis fusco-ferrugineis. Tibiae spinulis crassitie tibiae brevioribus.

7. *Megacoelum Schoutedeni* n. sp.

Pallide ochraceum, articulo primo antennarum apicem versus femoribusque posticis apice nonnihil in ferrugineum vergentibus; tibiis posticis basi fuscis; oculis fusco-nigris; scutello angulis basalibus hemielytrisque obscure fuscis vel castaneis, limbo exteriore corii pallido, cuneo nonnihil rufescente, membrana obscure fumata, vivaciter iridescente, venis fuscis; capite pronotoque glabris, scutello hemielytrisque sat longe flavo-pilosus, pilis retrorsum vergentibus. Long. ♂ 6 mm.

Townsville, d. 28 maji 1903; comm. D. Schouteden.

Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, vertice maris oculo aequa lato. Rostrum medium coxarum posticarum attingens. Antennae articulo primo pronoto circiter $\frac{1}{4}$ breviore, secundo primo saltem duplo et margine basali pronoti distincte longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ brevius, disco versus apicem fortiter convexo-declivi, laevi. Scutellum modice convexum, transversim obsoletissime aciculatum. Hemielytra sublaevia. Femora postica inferne apicem versus spinulis nonnullis biseriatis instructa. Tibiae testaceo-

¹) *Sabellicus sordidus* (Walk.) Dist. ab eo distinctus videtur.