

spinulosae, posticae leviter curvatae, spinulis crassitiei maxima tibiae aequae longis. Tarsi postici articulo primo secundo aequae longo.

8. Niastama n. g.

Fig. 6.

Genus divisionis Capsaria m. Corpus oblongum, nitidum, superne glabrum; capite laevi, fortiter nutante, basi pronoti fere duplo angustiore, ab antico viso latitudini frontis oculique unici aequae longo, a latere viso altitudine basali paullo breviore, vertice immarginato, modice lato, fronte sat fortiter declivi, clypeo basi arcuato, dein perpendiculari, prominente, basi a fronte discreto, ipsa basi paullo supra medium altitudinis capitis a latere visi posita, loris arcuatis, ab infero carinato-compressis, genis sat altis, gula brevissima; oculis laevibus, in lateribus capitis sat oblique positis et in genas modice extensis, orbita interiore apicem versus fortiter divergentibus et leviter sinuatis; antennis supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo linearci capite paullo breviore, secundo sat longo, versus apicem sensim leviter in crassato; pronoto transverso, trapeziformi, lateribus rectis, basi medio leviter et breviter sinuata, disco versus apicem sat fortiter declivi, foveolato-punctato, foveolis subtransversis, callis transversalibus, parvulis, interne leviter distantiibus, externe a margine longius remotis, postice tertiam apicalem partem pronoti vix attingentibus, marginibus omnibus impressis, strictura apicali tenui; scutello transversim fortiter strigoso; hemelytris punctatis, corio apicem versus cuneoque laevigatis, hoc oblongo-triangulari; membrana biareolata, areola majore angulo apicali interiore fere rectangulari; xypho prosterni marginato; coxis anticis medium mesosterni superantibus; orificiis metastethii sat parvulis. (Pedes desunt.)

Genus vertice immarginato, capite pronoto fere duplo angustiore, margine basali pronoti medio leviter sinuato, disco hujus foveolato-punctato stricturaque apicali tenui insigne; statura quibusdam speciebus generis *Lygus* Hahn, Reut., nonnihil similis.