

Campylotropis, nov. gen.

Corpus elongatum, glabrum, capite basi pronoti duplo angustiore, ab antico viso latitudini cum oculis longitudine subaequali, vertice deplanato, utrinque ad oculum foveolâ obliquâ notato, margine postico carinato, carinâ retrorsum late arcuatâ, fronte sat fortiter declivi, clypeo compresso, perpendiculari, medio haud depresso, genis modice altis, gulâ horizontali supra planum peristomii positâ, bucculis antice laminatis; rostro apicem mesosterni attingente, articulo primo gulam haud superante; oculis a pronoto paullo remotis; antennis articulo primo proto breviore, sed apicem clypei longius superante, cylindrico, basi attenuato et leviter curvato, secundo versus apicem sensim leviter incrassato, latitudine basali pronoti longiore, ultimis simul sumtis secundo brevioribus; pronoto ante medium sulco transversali latera superante instructo, parte apicali subhorizontali, lateribus rotundatâ, apice ante callos breviter constricto, his maximis, transversis, rotundatis, marginibus impressis; parte pronoti posteriore a sulco versus basin sensim fortiter ampliato, lateribus ante angulos posticos sinuatis, disco a basi sulcum versus declivi, antice pone sulcum transversalem obtuse biimpresso, inter impressiones vittâ vel carinâ obtusâ laevi inter callos prolongatâ, basi et lateribus ante angulos posticos leviter obtuse impressis, angulis posticis acutis, margine basali subtruncato, versus angulos antrorsum rotundato; prostethio ad rimam acetabulorum externe bituberculato; mesosterno nitido; coxis anticis brevibus, medium mesosterni vix attingentibus, posticis contiguis; tarsis posticis breviusculis, articulo tertio secundo vix longiore, unguiculis apice uncinatis.

Generi *Cyllocoris* Hahn, Reut. affinis; differt autem margine verticis retrorsum arcuato, margine basali pronoti subtruncato, mesosterno nitido et praecipue coxis posticis contiguis; a genere *Globiceps* Fieb. corpore squamis argenteis destituto, articulo primo antennarum apicem clypei longius superante, basi leviter arcuato, clypeo prominente, bucculis antice laminatis, mesosterno nitido, ab *Aetorrhino* Fieb. structurâ verticis, rostro breviore, structurâ antennarum, margine basali pronoti subtruncato, mesostethio nitido, etc. divergens. Etiam femina hemielytris alisque bene explicatis. Caput a supero visum longitudine vix duplo latius, a latere visum altitudini aequo longum, basi clypei in linea inter scrobes antennarum ducendâ positâ. Oculi sublaeves, in genas leviter extensi. Antennae fere ad quartam apicalem partem marginis interioris oculorum insertae. Pronotum basi longitudine latius. Scutellum basi detectâ. Hemielytra abdomen longe superantia, utriusque sexus parallelia, corio venis distinctis, venâ cubitali apice furcatâ ramum ad angulum apicalem exteriorem emittente, cuneo elongato-triangulari, membranâ biareolatâ, areolâ majore apicem versus sensim attenuatâ. Xyphus prostethii lateribus marginatis, disco plano. Mesosternum transversim sat convexum, apice medio canaliculatum. Femora elongata. Tibiae brevissime tenuiter spinulosae. Terebra feminae longa, fere quartam basalem partem ventris attingens, apice mucronata.