

Ad cognitionem
Capsidarum aethiopicarum.

Scripsit

O. M. REUTER.

II.

Species sequentes perplures benevole communicaverunt
D. H. Schouteden Bruxellensis et D. Dr E. Bergroth.
Solum nonnullae, a D:o D:re K. M. Levander in Erythraea
inventae, in museo Helsingforsiensi asservantur.

1. *Stenodema carinata* (Fall.).

Reut., Uebers. pal. Stenodema-Arten in Öfv. Finska
Vet.-Soc. Förh. XLVI (1904), p. 7, 2.

Abessinia, 4 specimina varietatis *pallescens* Reut.

2. *Helopeltis Alluaudi* n. sp.

Inferne cum rostro et pedibus flavo-testaceus, capite,
pronoto scutelloque nigris, pronoto strictura apicali annuli-
formi ochracea vel rufotestacea, scutello medio cum spina
pallide flavente; hemielytris fuscesceni-nigris; antennis ni-
gris, articulo primo corpore dimidio (cum hemielytris) paullo
breviore, 3 mm. longo, basin versus late testaceo, tertio 4
mm. longo. Long. ♂ 7 mm.

Assinia, D. Alluaud, comm. D. Dr Bergroth.

Corpus valde nitidum. Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius. Pronotum basi longitudine cum strictura apicali paullo latius, utrinque ad angulum basalem sat fortiter impressum, disco versus stricturam apicalem fortiter convexo-declivi. Spina scutelli speciminis abrupta. Hemielytra abdomen sat superantia, margine laterali a latero viso pallido; membrana nigra. Femora leviter arcuata, apice clavato-in-crassata. Tibiae pallido-pilosulae.

3. *Helopeltis Bergrothi* Reut.

Ent. Monthl. Mag. (2) III (XXVIII), 1892, p. 159.

Camerun, D. L. Conradt 1899, comm. D. Schouteden.

Type paullo minor et in omnibus gracilior.

4. *Odoniella rubra* n. sp.

Rubra, glabra, solum hemielytris parce tenuissime ventreque fortius flavo-pubescentibus; membrana lutescente; oculis, macula obliqua dimidium apicalem corii occupante, limbo apicali membranae apiceque extremo tarsorum nigro. Long. ♀ 8 mm.

Assinia D. Alluaud.

Ab *O. Reuteri* Hagl. colore valde diversa distincta. Genus *Odoniella* Hagl. generi *Rhopaliseschatus* Reut. valde affine, lateribus capitinis pone oculos oblique convergentibus, oculis a latere visis magis oblongis, antennis ad medium marginis interioris oculorum insertis, lateribus pronoti postice in lobum semicircularem ampliatis, clavo, corio, embolio cuneoque aequaliter incrassatis divergens. Structura antennarum adhuc ignota; antennae speciminum mutilatae. Caput *O. rubrae* strictura apicali pronoti paullo magis quam dimidio latius, vertice canalicula media nulla vel obsoletissima. Rostrum coxas anticas paullulum superans. Antennae articulo primo crasso, apicem clypei attingente. Pronotum, stri-

ctura apicali excepta, longitudine fere duplo latius, inter angulos loborum lateralium strictura apicali circiter quadruplo latius; callis duobus parvis apicalibus pone stricturam lutescentibus. Scutellum pronoto, strictura apicali excepta, aequo longum, medio sulco longitudinali subdistincto. Unguiculi basi dentato-ampliati, aroliis fortiter curvatis, latis, cum dente connexis. Structura et sculptura ceteris cum descriptione *Odoniellae Reuteri* Hagn. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1895, N:o 7, p. 468) congruentia.

5. *Pantiliodes Tellinii* n. sp.

Pallide ochraceus, opaculus; fronte utrinque lineis 7 obliquis impressis subferrugineis; antennis articulo primo atromissis ferrugineis adsperso; pronoto limbo tenui basali ante marginem concolorum maculisque duabus parvulis sat late distantibus mox pone medium disci nigro-fuscis; scutello basi vittulis duabus nigro-fuscis, apice nigro; membrana pallide fumata, venis ferrugineis, area majore parallelia, angulo interiore apicali angulato-rotundato; capite a latere viso altitudini basali vix aequo longo, fronte fortiter declivi, gula brevi; pronoto disco postico ruguloso. Long. ♀ 6 $\frac{1}{2}$ mm.

Abessinia: N. Dongotto, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

P. pallido (Ramb.) similis, sed signatura pronoti capite que breviore divergens. Caput basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ angustius, vertice oculo aequo lato. Oculi fusci. Rostrum apicem coxarum posticarum subbattingens. Antennae articulo primo pronoto aequo longo, secundo primo circiter $2\frac{1}{3}$ longiore, tertio secundo circiter $\frac{1}{6}$ breviore. Pronotum latitudine basali paullo magis quam $\frac{1}{3}$ brevius.

6. *Pleurochilophorus* nov. gen.

Corpus oblongum, nitidum, superne subglabrum et sublaeve, pube aurea faciliter divellenda destitutum; capite ver-

ticali, basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$, angustiore, ab antico viso latitudine cum oculis breviore, a latere viso altitudine distincte breviore, vertice immarginato, angusto, medio sulco tenui longitudinali instructo, fronte supra basin clypei tumido-convexa, clypeo verticali, basi a fronte impressione profunda discreto, angulo faciali recto, loris leviter convexis, genis humilibus, gula dimidium capitis occupante, levissime obliqua; oculis granulatis, in vertice parallelis, dein margine interiore fortiter sinuatis; rostro apicem coxarum posticarum paullo superante; antennis mox infra medium oculorum interne insertis, longis, articulo primo spinulis vel setis rigidis instructo, reliquis glabris, duobus ultimis secundo aequae crassis; pronoto leviter transverso, trapeziformi, strictura apicali basi articuli secundi antennarum multo tenuiore, callis bene discretis, medio distantibus, disco inpunctato, lateribus utrinque longitudinaliter depresso et usque ad callos obtuse marginatis, limbo basali retrorsum leviter declivi, margine latissime rotundato; scutello parte basali detecta, apicali leviter convexa, basi medio carunculo convexiore instructa; hemelytris explicatis, solum venis duabus distinguendis, membrana areola majore apice rotundata; femoribus posticis elongatis, reliquis multo longioribus, tarsis articulo primo margine inferiore eodem secundi parum breviore.

A *Megacoelo* Fieb., cui maxime affinis, fronte tumido-convexa, clypeo basi a fronte impressione profunda discreto, pronoto superne lateribus obtuse sed distincte marginatis structuraque scutelli divergens.

Pleurochilophorus quadripunctatus n. sp.

Pallide stramineus vel virescenti-stramineus, fronte, clypeo lorisque in ferrugineum vergentibus; antennis articulo primo atomis nigricantibus sat parce adsperso, setis rigidis nigris ad partem adpressis instructo; pronoto utrinque puncto supra angulos posticos punctisque duobus carunculi scutelli nigris; femoribus posterioribus inferne apicem versus biseriatim tibisque quadriseriatim sat longe nigro-spinulosis. Long. ♀ $8\frac{4}{5}$ mm.

Erythraea, 1 ♀, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

Vertex (♀) oculo aequo latus. Antennae articulo primo diagonali laterum capitis aequo longo, secundo primo circiter triplo et latitudine basali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ longiore, tertio secundo circiter $\frac{1}{5}$ breviore. Pronotum latitudine basali solum circiter $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{4}$ brevius, basi quam apice duplo latius, disco apicem versus leviter declivi, apice ad callos depresso. Hemielytra abdomen longe superantia.

7. Oxacicoris nov. gen.

Corpus oblongum (♂) vel oblongo-ovale (♀), superne laeve, tomento aureo vel argenteo facile divellendo vestitum, inferne pallido-pubescent; capite basi pronoti duplo angustiore, leviter nutante, ab antico viso latitudine cum oculis longiore, infra oculos subrostrato-producto, a latere viso altitudine basali longiore, vertice immarginato, sulco longitudinali destituto, fronte parum declivi, clypeo a fronte leviter discreto, fortiter prominente, a latere viso lato, basi in capite a latere viso alte posita, margine apicali late arcuato, angulo faciali subrecto, loris leviter arcuatiss, genis mediocribus, gula longa, horizontali; oculis pronoto contiguis, granulatis, orbita interiore apicem versus sinuatis, a latere visis oblongo-reniformibus, in genas modice extensis; rostro coxas posticas longe superante, articulo primo caput paullo superante; antennis paullo infra tertiam apicalem partem oculorum in sinu eorum interne insertis, longis, gracilibus, articulo primo elongato et secundo saltem duplo crassiore, capite breviore, secundo linearis, ultimis secundo nonnihil tenuioribus, simul sumtis secundo longioribus; pronoto transversali, trapeziformi, sulco transversali latera superante destituto, margine basali late rotundato, lateribus rectis, obtusis, strictura apicali basi articuli secundi antennarum crassiore; scutello basi obtecto; hemielytris explicatis, abdomen paullo (♀) vel longe (♂) superantibus, venis parum distinctis, cuneo latitudine basali longiore, membrana biareolata, areola majore angulo interiore in angulum fortiter acutum longe producto; xypho prosterni

marginato; orificio metasterni distinctis; coxis anticis medium mesosterni longe superantibus, posticis ab epipleuris hemielytrorum modice distantibus; femoribus posticis longis, elongatis, tibiis breviter et tenuiter spinulosis, tarsis margine inferiore articuli primi eidem articuli secundi fere aequo longo, tertio secundo longiore, ungivculis simplicibus, a medio obtuse curvatis.

Generi *Calocoris* Fieb.; Reut. affinis, capite longius producto, rostro antennisque longioribus, his articulis tribus ultimis gracilibus, secundo lineari, duobus ultimis hoc longioribus, praecipue autem areola membranae majore angulo interiore apicali acute producta distinctus.

Oxacicoris bimaculicollis n. sp.

Elongatus, albidus, vel grisecenti-albicans, nitidus, magis minusve nigro-fusco-signatus, pronoto limbo basali, margine excepto, nigro-fusco, disco medio maculis duabus sat parvis, nec non vitta longitudinali postice dilatata infra marginem superiore epipleurorum posita nigerrimis; scutello linea media longitudinali alba; membrana venis albis. Long. ♂ 6—6 $\frac{2}{3}$, ♀ 5 mm.

Var. β: Pallide fuscescenti-grisescens; saepe clypeo versus apicem marginibusque lorarum fuscis, fronte utrinque striatis fuscescentibus, medio vitta longitudinali albida; pronoto ut in typō, sed etiam linea tenui media longitudinali marginibusque lateralibus tenuiter nigro-fuscis, callis saepe fusco-conspurcatis; scutello nigro-fusco, linea media longitudinali albida; hemielytris dense obscure fusco-conspurcatis vel maximam ad partem nigro-fuscis, corio basin versus pallido-conspurcato, commissura tenuiter pallida; cuneo albido, angulo iuxtiore late apiceque anguste obscure fuscis; membrana magis minusve infuscata, venis albidis; pectore nigro-fusco, utrinque vitta per orificia ducta vittisque duabus superioribus epipleurorum prothoracis, quarum una marginali, albis; ventre fusco-consperso vel nigro-fusco, utrinque vittis tribus postice abbreviatis albis. ♂♀.

Erythraea: ad Ghinda! in regione silvestri d. 7 et 8 februarii; Massauah!, D. Dr Levander (Mus. Helsingf.); Assetch!, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

Caput pronoto aequa longum vel (σ) fere paullo longius, latitudine cum oculis fere dimidio longius, a latere vi-
sum altitudinem latitudine clypei superans, vertice oculo cir-
citer duplo ($\sigma\varphi$) latio. Antennae articulo primo capite ab
antico viso circiter $\frac{1}{4}$ ($\sigma\varphi$) breviore, secundo primo circiter
triplo et margine basali pronoti circiter dimidio longiore, ter-
tio secundo circiter $\frac{1}{4}$ —paullulum, quarto tertio circiter $\frac{1}{3}$
breviore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, basi
qvam apice duplo (σ) vel magis qvam duplo (φ) latius. Scu-
tellum pronoto aequa longum. Tibiae spinulis concoloribus
crassitie tibiae fere aequa longis.

8. *Charitocoris sangvineonotatus* n. sp.

Pallide albido-stramineus, superne subtiliter flavicanti-
pubescens, oculis nigris, rostro apice nigro; pronoto limbo
basali, clavo ante medium corioque fascia vel macula magna
apicali nec non femoribus posticis apicem versus sangvineo-
conspurcati, tibiis tenuiter nigro-spinulosis, tarsis totis ni-
gris; vertice oculo paullo angustiore (σ) vel paullo latiore
(φ); segmento maris genitali mutico, basi leviter sangvineo-
consperso. Long. σ $4\frac{3}{4}$, φ $5\frac{2}{3}$ mm.

Somalis, 1 σ , 2 $\varphi\varphi$, comm. D. Schouteden.

Species notis plurimis characteristicis cum genere *Cha-
ritocoris* Reut. (Caps. persic., in Ann. Mus. de l'Ac.
Sciences St. Petersb. T. IX (1904), p. 10) congruit, differt so-
lum antennis ad marginem oculorum interiore paullo altius
positis stricturaque apicali pronoti paullo tenuiore. Corpus
oblongum, pallide pubescens, superne sublaeve. Caput forti-
ter nutans, basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, ab antico vi-
sum fortiter (σ) vel sat leviter (φ) transversum, a latere vi-
sum altitudini fere aequa longum, vertice immarginato, sulco
destituto, clypeo prominente, verticali, basi a fronte sat dis-
creto, ipsa basi in medio altitudinis capit is posita, loris haud
buccatis, genis humilibus (φ) vel humillimis (σ), gula brevi,

subhorizontali. Oculi pronoto contigui, granulati, orbita interiore praecipue maris fortiter sinuati. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens vel paullulum superans. Antennae longius supra apicem (♀) vel mox infra medium oculorum interne insertae, articulo primo capite ab antico viso breviore, secundo linearci, margine basali pronoti paullulum longiore, duobus ultimis secundo gracilioribus et simul sumtis hoc paullo brevioribus, tertio secundo fere $\frac{2}{5}$ breviore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ brevius, apice quam basi duplo angustius, lateribus subrectis, disco laevi, apicem versus modice convexo-declivi, strictura apicali crassitie articuli antennarum secundi distinete graciliore. Hemielytra explicata, abdomen ($\text{♂} \text{♀}$) modice superantia, cuneo elongato-triangulari, membrana areola majore apice fere acutangulata. Femora elongata, apicem abdominis haud superantia. Tibiae spinulis tenuibus crassitie maxima tibiae brevioribus. Tarsi articulis aequae crassis, articulo primo margine inferiore eodem margine secundi fere duplo longiore, tertio primo paullo breviore.

9. Linocerocoris Karsch.

Ent. Nachr. XVIII (1892), p. 133.

Corpus magnum, oblongum, glabrum, nitidum; capite, pronoto scutelloque sublaevibus, hemielytris crebre punctulatis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ breviore, leviter nutante vel fere porrecto, pronoto paullo breviore, infra oculos longe et late producto (prolongatione infraoculari margini interiore oculorum aequae longa), ab antico viso latitudine cum oculis longiore, a latere viso altitudine basali saltem dimidio longiore, vertice immarginato, sat angusto, medio sulco longitudinali impresso, fronte levissime declivi, planiuscula, clypeo depresso-sculpido, ultra loras parum prominente, basi linea transversali leviter impressa a fronte discreto, basi fere in linea inter apicem oculorum ducenda posita, loris carinato-compres- sis, latis, margine laterali late curvatis, genis altis, gula subhorizontali peristomio saltem aequae longa; oculis laevi-

bus, a supero visis semiovalibus, margine interiore late sinuat-
tis, a latere visis in directione longitudinis capitis positis;
rostro apicem coxarum posticarum subattingente, articulo pri-
mo basin capitis vix superante; antennis paullo supra apicem
oculorum interne insertis, articulo primo pronoto breviore, a
basi gracili apicem versus modice incrassato, secundo fortius
incrassato, basin versus valde gracilescente ibique basi primi
aeque crasso; pronoto latitudini posticae aequo longo, versus
apicem leviter declivi, levissime convexo, margine basali late
rotundato, marginibus lateralibus subrectis, subacutiusculis,
strictura apicali crassitie articuli primi antennarum paullo la-
tiore, callis depressis, externe usque in marginem prolonga-
tis, interne contiguis, marginibus reliquis bene impressis, mar-
gine laterali oblique in marginem pronoti excurrente; scu-
tello oblongo-triangulari, basi obtecto; hemelytris abdomen
superantibus, venis omnibus elevatis, cubitali apice furcata,
cuneo oblongo-triangulari, membrana biareolata, areola ma-
jore angulo interiore subrectangulari; alis areola hamo desti-
tuto; xypho prosterni triangulari, tenuiter marginato; orificiis
metastethii rimam obliquam curvatam formantibus, margine
inferiore elevato; coxis anticis medium mesosterni superantibus;
femoribus elongatis, apice paullo gracilioribus, posticis
anticis fere duplo longioribus, tibiis breviter et tenuiter spi-
nulosis, tarsis breviusculis, gracilibus, articulo primo secundo
breviore, hoc tertio aequo longo.

Genus divisionis *Capsaria*, structura capitis levissime
nutantis et infra oculos longe producti, loris carinato-com-
pressis, oculis in directione capitis longitudinali positis, callis
pronoti usque in margines laterales extensis, etc. distinctissi-
mum.

Linocerocoris cariniventris Karsch.

L. c., p. 153, 10.

Inferne aurantiaco-flavus, unicolor, limbo superiore epi-
pleurorum pronoti nigro-piceo; superne nigro-piceus, capite, la-
teribus exceptis, pronoto vittis duabus percurrentibus, antice
confluentibus, retrorsum divergentibus, scutello vitta lata per-

currente, hemielytris vittula ad angulum scutellarem, vena clavi, vitta corii juxta suturam clavi, vena brachiali, plaga apicali apicem versus dilatata inter venam brachialem et cubitalem vittaque angusta exteriore juxta venam cubitalem aurantiaco-flavis; membrana fusca, venis connectente et cubitali aurantiacis, brachiali nigro-picea, areola minore maculaque infra apicem areolae majoris pallidis; antennis nigris, articulis ultimis fuscis, tertio dimidio basali flavo; pedibus aurantiacis, tibiis anterioribus apicem versus nigro-piceis, posticis nigro-piceis, ima basi aurantiacis, dimidio apicali cum tarsis albido-flaventibus. Long. ♀ $10\frac{1}{2}$ mm.

Camerun, D. Conradt 1899, tria specimina.

Caput (♀) vertice oculo paullo latiore, obsolete transversim impresso. Antennae articulo primo capite ab antico viso paullulum breviore, secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti circiter $\frac{2}{5}$ longiore. Pronotum basi quam apice fere triplo latius.

10. *Eurycyrtus Bellevoyei* Reut.

Reut., Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXI, p. 34, 6. Hem. Gymn. Eur. V, p. 1, T. I, fig. 22.

Massauah, D. Dr Levander (Mus. Helsingf.).

11. *Stenotus distinctus* n. sp.

Elongatus, superne cum hemielytris piceus vel rufopiceus, tenuiter pallido-pubescent, vertice postice, pronoto vitta media longitudinali marginibusque lateralibus medio, scutello, basi excepta, parte basali corii extra venam brachialem, clavo apice, cuneo, angulo exteriore excepto, medio ventris, (antennis?), rostro pedibusque flavis, rostro articulis duobus apicalibus piceis, tibiis apice tarsisque nigris; capite ab antico viso leviter transverso, a latere viso altitudine basali parum longiore, clypeo basi cum fronte subconfluenta, gula sat brevi; rostro coxas posticas parum superante, articulo primo medium xyphi prosterni paullo superante. Long. ♂ $5\frac{1}{2}$ mm.

Abessinia: Adi Agri!, comm. D. Schouteden.

St. binotata (Fabr.) sat similis, sed minor et gracilior, aliter pictus, pronoto solum vitta media margineque laterali medio flavis, corio postice usque in marginem lateralem piceo, capite rostroque brevioribus divergens. Caput vertice (σ) oculo fere aequa lato, angulo faciali acutiusculo. Antennae mox infra medium orbitae interioris in sinu oculorum insertae (articuli desunt). Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{5}$ brevius, apice quam basi circiter duplo angustius, disco sat fortiter declivi, subtiliter punctulato. Scutellum sublaeve. Hemielytra abdomen modice superantia, membrana sat leviter fumata, venis rufo-piceis. Tibiae anticae solum postice tenuiter spinulosae, iintermediae sat longe piceo-spinulosae (posticae desunt). Tarsi intermedii (postici desunt) articulo primo secundo magis quam duplo longiore.

12. *Stenotus longipennis* n. sp.

Elongatus, sordide flavens, sat nitidus, superne tenuiter pallido-pubescent, oculis antennisque fusco-nigris, his maris fere ad medium orbitae interioris in sinu oculorum insertis, articulo primo diagonali laterali capitinis saltē aequa longo; vertice utrinque ad oculum stria introrsum curvata, fronte utrinque striolis 6—7, clypeo lorisque, pronoto callis vittisque quatuor retrorsum divergentibus, intermediis latius distantiibus, scutello punctis duobus basalibus, epipleuris pronoti vittis duabus, mesosterno, mesopleuris vitta obliqua, metapleuris, ventre utrinque vitta laterali segmentaque maris inferne piceis; hemielytris abdomen longe superantibus, pronoto fere quadruplo longioribus, dilute fuscescentibus, lateribus commissuraque, hac anguste, flaventibus, cuneo subsangvineo, limbo exteriore pallide flavente, membrana sat dilute fumata, venis subsangvineis, brachiali sordide flavente; capite maris ab antico viso latitudini cum oculis longitudine subaequali, a latere viso fere aequa longo ac alto, clypeo usque a basi fortiter prominente, basi a fronte bene discreto, gula dimidium capitinis occupante; pronoto fortiter transversim rugoso et punctato; rostro apicem coxarum posticarum attingente,

sed hand superante, flavente, articulo ultimo nigro-piceo; pedibus flarentibus, tibiis apice tarsisque nigris. Long. ♂ 8— $8\frac{1}{4}$ mm.

Abessinia: Asmara Cheren!, D. Tellini, 2 ♂♂, comm. D. Schouteden.

Species hemielytris longissimis, pronoto fortiter rugoso signaturisque capitinis et pronoti a reliquis bene distinctus. Caput basi pronoti saltem duplo angustius, basi clypei circiter in tertia superiore parte altitudinis capitinis a latere visi posita, angulo faciali subrecto. Antennae articulo secundo primo aequo crasso et hoc fere magis quam triplo margineque basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ longiore, duobus ultimis secundo gracilioribus et fere circiter $\frac{1}{5}$ brevioribus, quarto tertio parum breviore. Pronotum, strictura apicali excepta, latitudine basali circiter duplo brevius, apice quam basi fere triplo angustius, disco apicem versus sat leviter declivi. Scutellum planum, transversim strigosum. Hemielytra apicem abdominis usque a basi cunei superantia, obsolete punctulata, cuneo valde elongata.

13. *Lygus apicalis* Fieb.

Reut., Hem. Gymn. V, p. 110, 29.

Specimina abessinica var. typicae ceteris simillima, sed colore viridi obscuriore articuloque antennarum secundo apice late nigro divergunt. — Adi Agri.

14. *Lygus Schoutedeni* n. sp.

Oblongus, pallide virescens, pronoto pallido-pubescente, subtiliter punctulato, scutello hemielytrisque dense subargenteo-pubescentibus, illo transversim strigoso, his subtiliter punctulatis, corio apicem versus cuneoque sublaevibus; oculis fuscis; capite utrinque vitta lorarum margineque peristomii, pronoto fascia ante marginem basalem ultra angulos anterius preducta, vittula brevi anteriore superiore aliaque percurrente inferiore epipleurarum prothoracis, scutello vittulis duabus apicalibus, hemielytris lineolis maculisque parvis lon-

gitudinalibus, cuneo margine interiore apicem versus, mesosterno, mesopleuris vitta obliqua, ventre vittis duabus lateralibus, exteriore postice abbreviata, tarsis articulo ultimo apice nigris vel nigro-piceis; membrana hyalina, areola maiore interne et apice nigro-variegato, minore nigra, vittula arcuata inter apicem areolae minoris et apicem cunei, vitta arcuata ab apice areolae majoris ad medium marginem exterioris ducta ibique dilatata, nec non arcubus duobus discoidalibus venae brachiali parallelis nigris, posteriore sat obsoleto; antennis articulo secundo margine basali paullulum longiore, ultimis pallidis; tibiis pallido-spinulosis, punctis destitutis. Long. ♀ $5\frac{2}{3}$ mm.

Abessinia: Asmara Cheren!, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

Species signaturis nigro-piceis, articulis ultimis antennarum pallidis, tibiis pallido-spinulosis distincta. Caput basi pronoti duplo augustius, ab antico visum latitudini frontis oculique unici aequa latum, a latere visum altitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ brevius, vertice tenuissime marginato, sulco medio longitudinali impresso. Antennae articulo primo capite paullo breviore, secundo primo circiter triplo longiore, tertio secundo circiter $\frac{2}{5}$ breviore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, apice quam basi circiter $\frac{3}{5}$ angustius, strictura annuliformi apicali apici articuli secundi antennarum aequa crassa, disco apicem versus sat convexo-declivi, callis parvulis. Hemelytra abdomen sat longe superantia. Tibiae ipso apice infuscato, anticae solum interne tenuiter spinulosae, intermediae triseriatim spinulosae. (Pedes postici desunt.)

15. Lygus Alluaudi n. sp.

Olivaceo-testaceus, ipso apice clypei oculisque nigris; scutello basi lateribusque fuscescenti-lurido, medio apiceque flavescente; hemelytris fuscescenti-luridis, clavo limbo scutellari commissuraque, sutura clavi, corio vena cubitali, vitta ejus dilatata apicali margineque exteriore, cuneo angulo interiore late apicalique angustius nigro-piceis, membrana fusca, venis nigro-piceis, cuneo medio pallide flavente; femoribus po-

sticis annulo anteapicali nigro-piceo, tibiis piceo-spinulosis, punctis destitutis, anticis apice latius, posterioribus anguste nigro-fuscis, tarsis articulo ultimo dimidio apicali nigro-piceo.
Long: ♀ 6 mm.

Assinia, D. Alluaud.

Corpus ovale, subglabrum. Caput (♀) basi pronoti magis quam duplo angustius, verticale, ab antico visum fortiter transversum, a latere visum altitudine circiter duplo brevius, clypeo a fronte discreto, genis oculo fere duplo humilioribus, gula brevi, obliqua; vertice oculo parum latiore, tenuiter marginato. Antennae articulo primo capiti longitudine aequali, apicem clypei longe superante. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, disco convexo versus apicem fortiter declivi, sat remote subtiliter punctulato. Scutellum transversim strigosum. Hemelytra sat remote subtiliter punctulata, corio apicem versus cuneoque laevigatis. Venter pallido-pubescentia. Tibiae posticae levissime curvatae. Tarsi postici articulo secundo primo distinete longiore et tertio aequo longo.

16. *Poeciloscytus longirostris* n. sp.

Inferne et superne pilis facile divellendis cinereis vel subargenteis vestitus, inferne flavescens, superne fusco-niger, nitidus; vertice macula utrinque ad oculum, pronoto strictura apicali, linea tenui longitudinali media percurrente limboque basali anguste, scutello apice late fuscescenti-testaceis; hemelytris fuscescenti-testaceis, clavo toto, corio dimidio interiore cuneoque angulo interiore fusco-nigris, membrana cum areolis fuscescenti-fumata, venis albidis, macula parva ad apicem cunei hyalina; antennis pallide flaventibus, maris articulo secundo lineariter incrassato et primo aequo crasso, tercia apicali parte obscure fusco, tertio, basi excepta, quartoque fuscis; rostro flavente, apice nigro, apicem coxarum posticarum superante. Long. ♂ 4³₄—5 mm.

Massauah, 2 ♂♂, D. Dr Levander (Mus. Helsingf.).

Species signatura pronoti, colore hemelytrorum praecipue rostro longiore a reliquis mox distinguenda. Caput (♂) basi pronoti parum magis quam $\frac{2}{5}$ angustius, ab antico

visum latitudini paullulum brevius, vertice marginato oculo paullo latiore, clypeo a fronte bene discreto, angulo faciali acuto, genis humilibus, gula sat longa. Oculi maris magni, convexi, prominentes, in genas longius extensi. Antennae mox infra tertiam apicalem partem marginis interioris oculorum insertae, articulo primo apicem clypei paullulum superante, secundo primo paullo magis quam triplo longiore, illo aequocrasso, tertio multo graciliore et secundo paullo magis quam duplo breviore, quarto tertio graciliore et distincte longiore. Rostrum articulo primo medium xyphi prosterni superante. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{3}{8}$ brevius, basi quam apice fere triplo latius, disco sat fortiter convexo-declivi, nitido, crebre subruguloso-punctulato. Scutellum pronoto parum brevius, oblongo-triangulare, transversim strigosum. Hemelytra sublaevia. Metastethium orificiis rimam angustam formantibus. Pedes exemplis desunt.

17. *Proboscidocoris* Reut.

Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXV, 1882, p. 30, 61.

Descriptio hujus generis l. c. ad partem incompleta, ad partem incorrecta. Caput nutans vel subporrectum. Vertex marginatus (margo elevatus, tomento divulso, bene distinctus). Tibiae tetragonae, marginibus quatuor spinulis armatis. Pronotum strictura apicali apice articuli antennarum secundi latiore. Tarsi articulo primo brevi, duobus ultimis longitudine aequalibus, unguiculis basi dentato-ampliatis, dein sat fortiter curvatis, aroliis valde divaricatis.

Generi *Charagrochilus* Fieb. affinis, capite longiore, latitudini cum oculis saltem aequo longo, articuloque secundo tarsorum longiore divergens.

P. fuliginosus Reut. l. c.

Descriptio incompleta et ad partem incorrecta. Vertex maris oculo $\frac{2}{5}$ latior. Rostrum apicem coxarum posticarum

paullo superans, articulo primo medium xyphi attingente. Antennae articulis ultimis nigro-fuscis, tertio basi albido. Pronotum latitudine basali $\frac{1}{4}$ (σ) vel (φ) circiter $\frac{1}{3}$ (false describitur dimidio) brevius, dorso sat fortiter rugulosum. Cuneus etiam apice testaceo. Femora obscure fuliginosa, postica cum coxis dimidio (φ) vel $\frac{2}{5}$ basalibus (σ) albidis, parte apicali nigro-fuliginosa, interdum pallidius variegata. Tibiae sordide flavo-testaceae vel pallide flaventes, interdum basi infuscatae, extremo apice fusco. Ceteris vide descriptionem l. c. Long. σ $4\frac{1}{2}$ - $4\frac{3}{4}$, φ $6\frac{1}{2}$ mm.

Camerun: Lanaza!, 1 φ ; Fernando-Po!, S:a Isabel!, mm. Martii et Julii, 2 $\sigma\sigma$, comm. D. Schouteden; Assinia, D. Alluaud.

Var. β vitticeps: Capite pallide ochraceo, vitta media longitudinali nigra signato.

Var. γ pallidiceps: Capite toto pallide ochraceo.
Assinia.

18. *Proboscidocoris punctaticollis* n. sp.

Niger, opaculus, tenuiter griseo-pubescent, superne et inferne pilis argenteis facile divellendis sat dense vestitus; capite macula utrinque verticis ad oculum, corio macula humerali, margine laterali exteriore margineque apicali, hoc tenuiter, sed medio latius, nec non extremo apice scutelli et cunei obscure testaceis; membrana cum areolis fusco-fumata, venis albidis, macula parva ad apicem cunei albido-hyalina; antennis albidis, articulo primo fusco-testaceo; secundo fere tertia apicali parte nigro fusco, tertio, parte tertia basali excepta, quartoque fuscescentibus; pedibus albidis, femoribus apice, posticis $\frac{2}{3}$ apicalibus, basi tibiarum posticarum extremoque apice tibiarum articulique tertii tarsorum fusco-nigris; pronoto scutelloque sat profunde impresso-punctatis. Long. σ 4— $4\frac{1}{2}$ mm.

Erytraea ad Ghinda in regione sylvatica, 2 $\sigma\sigma$, D. Dr Levander (Mus. Hels.).

A *Pr. fuligionoso* Reut., cui colore sat similis, pronoto profunde impresso-punctato mox distinguendus. Caput basi

pronoti duplo angustius, ab antico visum latitudine cum oculis distincte longius, vertice (♂) oculo duplo latiore. Rostrum apicem coxarum posticarum paullulum superans, articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae articulo primo capite circiter $\frac{2}{5}$ breviore, secundo margini basali pronoti aequo longo, tertio secundo fere duplo longiore, quarto tertio paullulum longiore. Pronotum latitudine basali circiter solum $\frac{1}{4}$ brevius, apice quam basi saltem $\frac{3}{5}$ angustius, strictura apicali apici articuli primi antennarum aequo crassa, disco convexo, apicem versus fortiter declivi, profunde impresso-punctato, postice inter puncta ruguloso. Scutellum transversim strigosum, impresso-punctatum. Hemielytra clavo corioque interne distincte sed sat subtiliter punctatis, cetero angulo interiore areolae majoris subrecta.
tast^{thii} sordide albida. Tibiae spinul-

fusca; area orificiorum metastethii albida; femoribus cum coxis nigro-fuscis vel fuscis, illis annulo infra basin albido, interdum apicem versus testaceo-variegatis, tibiis tarsisque testaceis, illis saepe inferne et basin versus fuscescentibus, spinulis brevibus pallidis, tarsis apice fusco. Long. ♂ 3, ♀ $3\frac{1}{2}$ — $3\frac{3}{4}$ mm.

Tokal, Key, 1 ♂, 2 ♀♀.

A *Pr. nigricorni* Reut. colore antennarum, pronoti et scutelli, vertice latiore, pronoto minus transverso, transversim fortiter rugoso, a *Pr. longicorni* Reut.¹⁾ antennis aliter coloratis et constructis pronotoque magis transverso mox distinguendus.

20. *Proboscidocoris ferrugineus* n. sp.

Obscurè rufo-ferrugineus, superne leviter nitidulus, sat dense sed breviter aureo-pubescentis, inferne pallidius, mesosterno medio fusco; ventre dense breviter subargenteo-pubescente; antennis articulo primo ferrugineo, secundo basin versus pallidius flavente, apicem versus ferrugineo, apice nigro-fusco (ultimi desunt); femoribus anticis ferrugineis, posterioribus pallide flaventibus, inferne maculis ferrugineis in series duas collocatis, apice late ferrugineo vel fusco-ferrugineo, tibiis rufo-ferrugineis, tarsis apice articuli ultimi cum unguiculis nigro-fuscis. Long. ♀ 6 mm.

Assinia, D. Ch. Alluaud; comm. D. Bergroth.

A *Pr. fuliginoso* Reut. corpore distincte latiore, colore, pubescentia breviore et obscurius aurea vel fere orichalcea, pronoto minus fortiter rugoso-punctato mox distinguendus. Caput (♀) vertice oculo circiter $\frac{1}{3}$ latiore. Rostrum basin terebrae feminae paullo superans, apice nigrum, articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti distincte paullo breviore. Pronotum (♀) basi circiter $\frac{1}{3}$ brevius, disco fortiter convexo-

¹⁾ *Charagochilus nigricornis* Reut., Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XLVI, N:o 10 (1904), p. 2, 2, e Congo species est hujus generis, ut etiam *Ch. longicornis* Reut., Ent. Tidskr. 1884, p. 196, ex insulis Nicobaribus.

declivi, sat crebre subrugoso-punctato, apice qvam basi fere triplo angustiore, annulo collari apice articuli secundi antennarum distincte latiore. Scutellum extremo apice nonnihil pallidiore. Hemielytra unicolora, solum angulo interiore cunei nigro-fusco; membrana nigricante, venis ferrugineis, macula inter apicem cunei et apicem areolae minoris pallida. Tibiae obscure rufo-ferrugineae, marginibus spinulis concoloribus armatis, his crassitiei tibiae fere aequae longis. Tarsi cum ungivculis ut in praecedente constructi.

21. *Deraeocoris tibialis* (Reut.).

Camptobrochis id. Reut., Öfv. Finska Vet.-Soc. Förh. XLV, N:o 6, p. 12, 13 (1903).

Haec species melius in genus *Deraeocoris* locanda, *D. scutellari* (Fabr.) simillima, sed minor, angustior et minus convexus, scutello lutescenti-albido vel obscure luteo nec rubro, praecipue maris oculis majoribus verticeque angustiore distincta.

Mas (hactenus ignotus) ut femina coloratus, niger, stria transversali verticis scutelloque lutescenti-albidis. Oculi maximi, valde prominentes. Caput cum oculis basi pronoti paullo magis qvam $\frac{1}{3}$ angustius, ab antico visum fortiter transversum; vertice oculo aequa lato. Antennae articulo secundo margini basali pronoti aequa longo, sublineari, tertio secundo circiter duplo breviore et quarto paullo longiore. Pronotum latitudine basali fere duplo brevius, strictura apicali opaca. Hemielytra abdomen longe superantia, parallela, areolis membranae ut in femina. Pedes (etiam femoribus) albidi, femoribus apice leviter fuscescentibus, tibiis basi, annulo supra medium apiceque nigro-fuscis, tarsis nigris. Long. $5\frac{1}{4}$ mm.

Abessinia: Adi Agri!, 1 ♂ mm, 2 ♀♀.

Variat femina tota nigra, scutello obscure luteo, stria verticis lutea tenui, pedibus nigris, tibiis solum annulo luteo anteapicali.

22. *Deraeocoris pallidipennis* n. sp.

Niger, nitidus, glaber, stria verticis marginali marginata basali pronoti tenuiter luteis; scutello rufo-testaceo, saepe vitta media lutea, hemielytris sat obscure testaceis, remote nigro-punctatis, clavo toto (φ) vel solum limbo scutellari commissuraque, corio plaga dimidii apicalis, embolio apice cuneo-que apice late nigris, membrana nigricante, venis nigris, areolis maculaque sat magna infra apicem cunei hyalinis, interdum dimidio basali hyalino; tibiis annulis duobus albidis, altera angustiore in parte quarta basali posito, altero latiore infra medium; ventre maris testaceo, apice nigro. Long. ♂ $6\frac{1}{3}$, ♀ $4\frac{3}{4}$ mm.

Abessinia: Adi Caré!, comm. D. Schouteden.

An varietas *D. tibialis* Reut., sed major, oculis maris paullo minoribus. A *D. scutellari* (Fabr.) corpore graciliore, scutello rufotestaceo nec rubro, colore hemielytrorum, vertice maris angustiore hemielysrisque maris remotius et subtilius punctatis distinguendus. Caput basi pronoti paullo minus quam duplo angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici longitudine subaequale (φ) vel hac distincte brevius (σ), vertice oculo paullulum (σ) vel fere dimidio (φ) latiore. Antennae nigrae, articulo secundo (σ) latitudini basali pronoti aequi iongo, versus apicem leviter incrassato. Pronotum latitudine postica circiter $1/3$ brevius, apice quam basi triplo (σ) vel fere triplo (φ) angustius, disco sat convexo, fortiter sed modice dense punctato. Scutellum laeve. Hemelytra remote punctata, cuneo sublaevi. Area orificiorum metastethii alba. Pedes glabri. Unguiculi fortiter curvati, basi dentati.

23. *Trichophorella* nov. gen.

Corpus subelongatum, leviter nitidum, superne setis sat longis erectis instructum, capite a supero viso pronoto breviore et latitudine hujus circiter $2/5$ angustiore, antice rotun-

dato, vertice immarginato, horizontali, medio inter oculos impressionibus duabus transversis nitidis, fronte verticali, convexa, clypeo usque a basi sub angulo recto fortiter prominente, a latero viso parallelo, marginibus rectis, angulo faciali recto, loris discretis versus apicem oculorum vergentibus, gula sat brevi, subhorizontali; rostro linearis, coxas posticas superante, articulo primo apicem xyphi prosterni subattingente; antennis longis, ad medium marginis interioris oculorum insertis, articulo primo margini laterali pronoti aequo longo; pronoto latitudine basali distinete breviore, margine basali supra basin scutelli late sinuato, lateribus subrectis, disco versus apicem leviter declivi, callis parum elevatis, confluentibus, postice impressione transversa fere in medio disci posita terminatis, strictura apicali articulo secundo antennarum aequo crassa; scutello basi late detecto; hemielytris abdomen paullo longioribus, membrana biareolata, areola maiore angusta, apice rotundata; alis areola hamo destituta; xypho prosterni planiusculo, lateribus distinete marginato; coxis anticis medium mesosterni attingentibus, posticis ab epipleuris hemielytrorum sat leviter distantibus; femoribus elongatis, tibiis tenuiter spinulosis, tarsis posticis articulo secundo primo longiore et tertio aequo longo, ungaviculis modice curvatis, aroliis parum distinctis.

Genus divisionis *Pilophoraria* m., in vicinitate generum *Allodapus* et *Plagiorrhamma* locandum.

Trichophorella sordidipennis n. sp.

Iuferne nigra, superne nigro-fusca, sat longe erecte nigro-setosa, brevissime flavicanti-pubescentia, hemielytris griseo-scentibus, corio interne infra apicem clavi cuneoque nigro-fuscis, membrana fumata; antennis pedibusque sordide griseo-flaventibus, illis articulo primo toto, secundo basi inferne tertioque ima basi, nec non femoribus nigro-fuscis. Long. ♀ $4\frac{1}{2}$ mm.

Assinia, 1 ♀, D. Alluaud, comm. D. Bergroth.

Caput (♀) vertice oculo circiter duplo latiore. Antennae articulo secundo primo circiter $2\frac{1}{3}$ longiore, linearis. Pro-

notum latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{4}$ brevius, apice quam basi circiter $\frac{3}{5}$ angustius. Scutellum planum. Hemelytra (♀) apicem abdominis paullo superantia. Pedes longi, tibiis pallido-spinulosis.
