

rali remotis; marginibus lateralibus obtusis. Scutellum basi detecta densius subrugoso-punctata, utrinque carinula brevi obliqua instructa, parte apicali remotius punctata. Hemielytra medio pronoto fere dimidio latiora, membrana areola majore oblonga, angulo interiore apicali obtuse rotundato.

Div. Miraria Reut.

8. Dolichomiris linearis Reut., Öfvers. Finska Vet. Soc. Förhandl. XXV, p. 9. Ibid. XLIV, p. 159. *D. tibialis* Reut. Ann. Soc. Ent. France LXI, p. 392. *Notostira longula* Noualh., ibid. LXII, p. 15.

Las Adjuntas, unicum specimen.

Distr. geogr.: Venezuela (Colonia Tovar); Africa occidental (Addah); insulae Canarienses et Madeira; territorium occidentale mediterraneum Europae (Alpes maritimæ).

9. Collaria oleosa (Dist.) *Trachelomiris* id. Dist., Biol. Centr.-am., p. 238, T. XXIV, f. 2. *Collaria* id. Reut. Ann. Soc. Ent. France LXI, p. 393. Dist., Biol. Centr.-am. p. 417.

Caracas, tria specimina.

Distr. geogr.: Mexico, Panama, Guatemala, Nicaragua, Venezuela.

Div. Restheniaria m.

Corpus opacum, inpunctatum, rarissime omnium levissime nitidulum. Alarum areola hamo distincto vel oblitterato instructa, interdum hoc tota destituta. Arolia ungviculorum magna, libera, a basi usque divergentes. Caput loris haud discretis, genis altis. Pronotum strictura apicali crassa, callis distinctissimis strictura haud vel parum longioribus. Coxae posticae ab epipleuris hemielytrorum distantes. Tarsi articulo primo secundo longiore et crassiore, tertio lineari. Membrana semper nigra, unicolor.