

gulo interiore obtuse angulata; pedibus breviusculis, coxis anticis medium mesosterni superantibus, femoribus posticis reliquis crassioribus et anticis fere duplo longioribus, tibiis sat breviter spinulosis, tarsis posticis margine inferiore articuli secundi eodem primi vix longiore, tertio secundo longiore; segmento genitali maris mutico.

Generi *Lygus* Hahn, Reut. primo aspectu sat simile, ab eo et aliis affinibus corpore toto laevi structuraque capitis et pronoti mox distinguendum.

Lygidolon laevigatum n. sp.

Piceo-nigrum, nitidum, glabrum, margine postico verticis, apice scutelli, xypho prosterni coxisque anticis sulphureis, hemielytris, meso- et meta-pleuris, ventre medio late, rostro, antennis, pedibus pallide lividis; clavo, macula interiore anteapicali corii dimidioque apicali cunei piceo-nigris, membrana fumata, puncto ante medium marginis exterioris pallido; antennis articulo secundo plus quam tertia apicali parte nigro (ultimi desunt); femoribus posticis apicem versus ochraceis, tibiis tarsisque apice nigro-piceo, illis piceo-spinulosis; mesosterno medio ventreque lateribus fusco-piceis. ♂. Long. 3, lat. $1\frac{1}{3}$ mm.

Africa orientalis britannica, D. F. Thomas (Mus. Vindob.).

Caput (♂) basi pronoti vix magis quam $\frac{1}{4}$ angustius, ab antico visum longitudine fere duplo latius, a latere visum altitudine saltem duplo brevius, vertice oculo circiter $\frac{2}{5}$ angustiore. Antennae articulo secundo latitudine capitis parum longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius. Tibiae posticae spinulis crassitiei tibiae longitudine subaequalibus.

16. *Tropidophorella* nov. gen.

Corpus sat late ovale, pronoto scutelloque fortius, hemielytris subtiliter punctatis (pubescentia speciminis detrita); capite basi pronoti duplo angustiore, fortiter nutante, a superno viso pronoto $\frac{1}{3}$ brevior, ab antico viso latitudini cum