

strictura apicali bene discreta. *Xyphus prosterni* lateribus marginatus. Coxae posticae ab epipleuris hemielytrorum levissime distantes. Tarsi articulo primo secundo breviore.

A divisione *Capsaria loris* optime discretis linearibus, coxis posticis ab epipleuris hemielytrorum levissime distantibus aroliisque unguiculorum aliter constructis divergens

Pameridea nov. gen.

Corpus elongato-ovale, inpunctatum, leviter nitidulum, superne dense breviter nigro-pilosum; capite leviter nutante, basi pronoti angustiore, a supero viso pronoto, strictura ejus apicali excepta, parum breviore et latitudine sua basali distincte longiore, vertice immarginato, sulco tenui longitudinali instructo; capite a latere viso altitudini basali aequo longo, fronte subhorizontali, ipso apice valde declivi, clypeo fortiter prominente, a latere viso lato, basi supra medium altitudinis capitidis a latere visi posita, margine antico leviter arcuato, valde declivi, angulo faciali valde acuto, loris bene discretis angustis, bucculis linearibus, genis mediocribus, gula peristomio breviore, obliqua; oculi (σ) pronoto subcontiguis, vibus, a supero visis semiorbicularibus, a latere visis suborbicularibus, in genas modice extensis, orbita interiore subrecta apicem versus levissime divergentibus; rostro coxas intermedias attingente, articulis duobus primis pilosulis, primo caput paullo superante; antennis corpore circiter $1/3$ brevioribus, dense breviter pilosis, a margine oculorum interiore sat remotis et in linea mox supra apicem eorum insertis, articulo primo reliquis crassiore, apicem clypei leviter superante, apice nonnihil attenuato; pronoto trapezoidalili, marginibus omnibus rectis, angulis posticis rotundatis, marginibus lateralibus a latere visis basin versus acutiusculis, disco horizontali, sulco tenui medio longitudinali instructo, callis hand discretis, strictura apicali articulo primo antennarum parum tenuiore; scutello pronoto breviore, basi detecta; hemielytris (Ω) abdomen vix superantibus, lateribus subparallelis, commissa clavi scutello longiore, cuneo elongato-triangulari, apicem versus fortiter acuminato, basi longius infra angulum interiorem basalem membranae posita; membrana bi-areolata,