

Hemielytra usque a basi cunei abdomen superantia, membrana obscure fumata, venis fuscis.

28. *Nanniella chalybea* Reut.

Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVI, N:o 10, 1904, p. 6.
(Feminam nec marem l. c. descripsi).

Mas hactenus ignotus: a femina differt antennis longius supra apicem oculorum insertis, longioribus, articulo primo apicem clypei attingente, secundo margine besali pronoti distincte longiore, tertio secundo fere $\frac{1}{3}$, breviore, pronoto paululum longiore. Caput fortiter nitens, fronte (an semper?) foveola basali instructa.

Variat femina membrana griseo-fumata, area maculaque utrinque magna laterali hyalina.

Congo.

29. *Halticus tibialis* Reut.

Rev. d'Ent. X, 1891, p. 136, 8.

Congo: Boma, D. Tschoffen, comm. D. Schouteden.
Species hactenus solum in insula Java inventa.

Antennae ad medium marginis interioris oculorum insertae.

30. *Psallus dilutipes* n. sp.

Capite pronotoque luridulis, nitidis, illo apice, hoc ad angulos posticos infuscatis; scutello hemielytrisque pilis aureis fragilibus pubescentibus, nitidis, fusco-sanguineis, angulo exteriore apicali corii, lunula angusta obliqua basali apiceque extremo cunei pallidis, membrana aequaliter sat dilute fumata, venis decoloribus; inferne nigro-piceus, orificiis metastethii fuscis; rostro, antennis pedibusque cum coxis lividis, femoribus anterioribus solum puncto marginis superioris antepicali, posticis solum apice punctis nonnullis fuscis adspersis, tibiis spinulis nigris sat longis e punctis nigris parvulis nascentibus, tibiis anticis fere dimidio apicali punctis desti-