

21. Platyscytus nov. gen

Corpus parvum, ovale, superne deplanatum, sat nitidum, laeve et glabrum, pronoto disco postico versus apicem levissime declivi; capite basi pronoti angustiore, a supero viso pronoto duplo breviore et longitudine sua fere triplo latiore, vertice sat lato, aequali, antice inter oculos haud prominulo et margine levissime arcuato; capite ab antico viso fortiter transverso, a latere viso sat fortiter retrorsum vergente, inferne quam superne breviore ibique altitudine basali multo breviore, clypeo parum prominulo, genis (φ) oculo aequa altis, gula haud distinguenda; oculis apici pronoti subcontiguis, parvulis, a supero visis margine interiore retrorsum valde divergentibus, a latere visis reniformibus, in genas parum extensis, ab antico visis orbita interiore subparallelis; rostro gracili, coxas posticas attingente; antennis gracilibus, paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei haud attingente, secundo versus apicem sensim levissime incrassato, ultimis simul summis secundo paululum longioribus; pronoto sub-plano, fortiter transverso, subsemilunari, margine basali late sinuato, strictura apicali destituto, lateribus margine acutis, postice latiuscule sub-limbatis, callis sat elevatis, transversis, medio margine confluentibus, antice medio impressione, postice totis impressione transversa terminatis; scutello pronoto paullo longiore, basi detecta; hemielytris basi pronoti nonnihil latioribus, lateribus levissime rotundatis, venis nullis elevatis, sutura clavi scutello parum longiore, embolio a corio parum discreto, margine exterio tenuiter incrassato, cuneo subhorizontali, latitudine basali distinete longiore, fractura ejus anguloque basali membranae in linea eadem transversali positis, membrana biareolata; pedibus mediocribus, innotatis, femoribus posticis leviter incrassatis, tibiis tenuiter spinulosis, unguiculis minutis.

Genus pronoto semilunari insigne, verisimiliter hujus divisionis. Areolam alarum unguiculosque haud examinare potui.