

(♀), vertice oculo duplo (♂) vel magis quam duplo (♀) latiore; oculis minute sed distinete granulatis; rostro longo, medium segmenti genitalis (♂) vel medium ventris attingente (♀), antennis articulo secundo margine basali pronoti perparum longiore; pronoto basi longitudine saltem duplo latiore; segmento maris genitali inferne mutico, glabro. ♂ ♀. Long. 3, lat. ♂ 1, ♀ $1\frac{1}{3}$ mm.

Kingston, plura specimina.

Species colore insigni, capite rostroque longioribus femoribusque puncto setifero anteapicali marginis superioris de-stitutis ab affinibus divergens.

28. *Atomoscelis diaphanus* n. sp.

Ovalis, dilute virescens, flavo-pubescent, capite in pallide flavescentem vergente; antennis pallide stramineis, articulo primo puncto interiore imaque basi secundi nigris, articulo secundo latitudine capitidis paullulum longiore, duobus ultimis fuscescentibus, tertio secundo circiter $\frac{1}{4}$, quarto tertio $\frac{2}{5}$ breviore; hemielytris subdiaphanis, apice commissurae clavi nigro, membrana hyalina, puncto fusco paullo infra apicem venae cubitalis; pedibus albidis, femoribus dimidio apicali inferne atomis punctisque nonnullis nigris signatis, superne puncto marginis posterioris ante apicem et duobus — quatuor marginis anterioris, quorum duobus apicalibus setulam nigram fermentibus; tibiis sat longe nigro-spinulosis, spinulis versus basin tibiarum e punctis nigris distinctis nascentibus, tarsis apice articuli ultimi nigro-fusco; capite feminae basi pronoti angustiore, genis oculo saltem dimidio humilioribus. ♀. Long. 3, lat. $\frac{2}{5}$ mm.

Mandeville.

A. onusto H. S. statura et etiam apice nigro clavi simili-
lis, differt corpore multo majore, hemielytris diaphanis, im-
maculatis, membrana aliter signata, genis humilioribus, etc.

29. *Leucopoecila* n. gen.

Corpus parvum, maris oblongum, feminae breve, hemie-
lytris subparallelis, sat nitidum, subglabrum vel scutello hemie-