

Sixeonotus strigatifrons n. sp. Late et breviter ovalis, niger, nitidus, capite testaceo, vitta percurrente nigra notato; antennis, articulo primo excepto, rostro pedibusque albis; capite basi pronoti magis quam dimidio angustiore, fortiter nutante, ab antico viso latitudine basali cum oculis distincte longiore, infra oculos rostrato-producto, vertice oculo paullo magis quam triplo latiore, fronte fortiter declivi, convexa, utrinque transversim sat profunde impresso-strigata, medio fovea basali oblonga instructa, angulo faciali acuto, gula sat longa, obliqua; rostro coxas intermedias haud superante, articulo primo capite brevior; antennis articulo secundo latitudini capitis cum oculis aequae longo; pronoto latitudine postica parum brevior, lateribus subrectis, crebre fortiter impresso-punctato; scutello pronoto saltem $\frac{3}{5}$ brevior, medio convexiusculo, basi et apice depresso. Long. 2, lat. hemielytrorum $1\frac{1}{2}$ mm.

Mexico, 1 sp.

Bothrophorella Reut.

Caps. in Brasil. coll., 1907, p. 40.

Bothrophorella procurrens (Dist.) Reut., l. c., p. 41.

Orizaba, Puebla.

Eurychilella nov. gen.

Corpus ovale, cum hemielytris nitidum, subglabrum; capite basi pronoti minus quam dimidio angustiore, verticali, ab antico viso latitudine postica cum oculis breviora, a latere viso brevi et alto, fronte subverticali, canalicula media longitudinali distincta, vertice supra hanc lineam transversali impressa, clypeo compresso, usque a basi prominente, a fronte bene discreto, perpendiculari, ipsa basi in medio capitis a latere visis posita, angulo faciali recto vel subobtusio, genis oculis aequae altis, gula haud distinguenda; oculis apici pronoti contiguis, nonnihil retrorsum vergentibus, laevibus, a latere visis medium capitis haud superantibus, ovalibus, orbita interiore parallelis; rostro articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis mox supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, oculo a latere viso vix aequae longo, secundo hoc vix duplo longiore, versus apicem sensim incrassato, tertio secundo $\frac{1}{3}$ brevior; pronoto transversio, punctato, lateribus apicem versus late sinuatis, callis sat magnis et convexis, transversalibus, obliquis et retrorsum medio subcontiguis, limbo apicali ante eos punctulato, depresso, lato, obtuse triangulari (apice inter callos), antice levissime inter oculos prominulo, sed ipso margine medio late sinuato, disco pone callos convexo, utrinque ad angulos posticos impresso, margine basali latissime rotundato, basin scutelli obtegente; hemielytris embolio sat lato, parallelo, parum rotundato, clavo et corio subruguloso-punctulatis, cuneo laevi, sat declivi, latitudine basali parum longiore, incisura fracturae laterali nulla; membrana areola unica basali triangulari; mesosterno brevis, medio canaliculato; coxis anticis brevibus, medium mesosterni attingentibus, pedibus mediocribus, femoribus posticis elongatis, margine superiore ultra medium arcuato, dein parallelis, tibiis muticis, tarsis articulo primo brevi, usque a basi fesso, duobus ultimis simul sumtis versus apicem fortiter incrassatis.

Eurychilella pallida n. sp. Pallide cerina, hemielytris subtilissime pallidopubescentibus; clypeo, oculis, margine basali verticis, callis pronoti saltem antice, pectore abdomineque piceis; capite basi pronoti $\frac{2}{5}$ angustiore, ab antico viso latitudine verticis oculique unici vix longiore, vertice (♀) oculo paullo magis quam duplo latiore;