

primo aequo longo, duobus ultimis simul sumtis primis conjunctis aequo longis, tertio versus apicem attenuato, ultimo gracillimo, acuminato; antennis mox infra medium marginis interioris oculorum insertis, articulo primo apicem clypei attingente, secundo latitudini capitidis aequo longo, ultimis simul sumtis secundo longioribus, quarto tertio paullo breviore; pronoto transverso, trapeziformi, apice strictura tenui bene discreta instructo, hac strictura basi articuli secundi antennarum crassitie aequali, callis parvulis, a margine laterali remotis, disco punctulato, modice convexo, versus apicem sat fortiter declivi, limbo postico basin scutelli obtegente; scutello horizontali, laevi, pronoto circiter $\frac{2}{5}$ breviore; hemielytris medio ampliato-rotundatis, embolio sat late explanato, a corio toto discreto vel ad medium usque optime, dein obsoletius discreto, corio vena cubitali usque ad medium impressa, dein obsoleta, cuneo fortiter declivi, latitudine basali vix longiore; membrana vena arcuata, areola semiovali; mesosterno brevi; coxis anticis medium mesosterni paullo superantibus, pedibus breviusculis, tibiis muticis, tarsis posticis articulo ultimo apicem versus sat fortiter incrassato.

Monalocoris hesperius n. sp. Fusco-testaceus, unicolor, nitidulus, superne parum pubescens, capite, rostro, antennis pedibusque cum coxis pallidius flaventibus, articulo secundo antennarum (ultimi desunt) apice nigro, illo latitudine capitidis vix longiore; oculis nigricantibus; pronoto crebre sat subtiliter punctato, clavo punctulato, vena elevata laevi, corio intra venam cubitalem punctato-rugoso, extra hanc laevigato, embolio toto discreto, membrana pallida. Long. 2, lat. 1 mm.

Cuorna Vacca, m. Octobris.

M. filicis (L.) minor, pronoto hemielytrisque unicoloribus, pallidioribus, minus nitidis et parum pubescentibus, pronoto paullo fortius punctato, corio interne punctato-ruguloso embolioque usque ad apicem a corio optime discreto divergens.

Cyclidolon nov. gen.

Corpus late ovale, capite fortiter nutante, cum oculis margine apicali pronoti paullulum latiore, a supero viso transverso, pronoto circiter $\frac{1}{3}$ breviore, ab antico viso latitudine interoculari parum longiore, infra oculos sat breviter producto, vertice lato; capite a latere viso altitudine distinete breviore, fronte sat fortiter declivi, convexiuscula, clypeo usque a basi sat fortiter prominente, verticali, parallelo, basi mox infra medium capitidis a latere visi posita, a fronte parum discreta, angulo faciali recto, genis oculis paullulum humilioribus, gula vix distinguenda; oculis pronoto contiguis, laevibus, a supero visis semi-ovalibus, a latere visis ovalibus, in lateribus capitidis subverticalibus, orbita interiore parallelis; antennis ad medium orbitae interioris oculorum insertis, gracilibus, articulo primo brevi, apicem clypei haud attingente, secundo latitudine capitidis cum oculis vix longiore; pronoto lateribus explanato, latitudine basali paullo magis quam dimidio breviore, lateribus subrectis mox ante apicem subito arcuatis, ipso apice basi dimidio angustiore, strictura tenuissima sed distincta instructo, limbo basali retrosum declivi, basin scutelli obtegente, disco versus apicem leviter convexiusculo-declivi, subtiliter punctulato; scutello pronoto circiter $\frac{2}{5}$ breviore, basi longitudine latiore; hemielytris explanato rotundatis, basi pronoti latioribus, embolio sat angusto, explanato, basi reflexo, margine laterali versus apicem fortiter arcuato, corio lato, cuneo latitudini basali aequo longo, incisura exteriore fracturae valde profunda et latiuscula, margine exteriore basi fortiter arcuato, membrana areola unica semiovali; pedibus breviusculis, femoribus posticis linearibus, tibiis muticis, tarsis brevibus, apice sat incrassatis.