

nec non disco hyalinis, illis apice fumatis, venis nigro-piceis; lateribus pectoris et ventris picescentibus. ♂♀. Long. $4\frac{1}{2}$, lat. 2 mm.

Takubaya, unicus mas, Orizaba, m. Februarii, mas et femina.

Species signaturis brevitateque antennarum mox dignoscenda. Corpus oblongum (♂) vel ovale (♀). Caput basi pronoti circiter $\frac{3}{4}$, angustius, ab antico visum latitudini verticis oculique unici aequa longum, a latere visum altitudine multo brevius, clypeo parum prominente, gula haud distinguenda. Oculi nigri, maris altitudinem fere totam capitum occupantes, feminae in genas sat extensi. Rostrum apice piceo. Pronotum latitudine basali fere dimidio brevius, margine basali subcarinato-reflexo. Scutellum proto paullo brevius, basi obtectum. Hemielytra abdomen longius (♂) vel breviter (♀) superantia. Tibiae spinulis crassitiei tibiae longitudine subaequalibus, anticae margine antico muticae, posticae rectae, margine inferiore pilosulae.

Lygus (Paralygus) salléi (Stål). Ovalis, pallide sordide virescenti-stramineus, oculis nigris; pronoto sat remote subtiliter punctulato, linea continuali laterali marginali et basali intramarginali fusca; hemielytris sat remote punctulatis; unicoloribus, membra subhyalina, venis dilute fuscescentibus; antennis fere $\frac{1}{3}$ apicali articulorum secundi et tertii quartoque nigro-fuscis; spinulis tibiarum leviter fuscescentibus, posteriorum e punctis minutis fuscis nascentibus. ♂. Long. 6, lat. 2 mm.

Lygus Salléi Stål, Stett. Ent. Zeit., XXIII, 1862, p. 321, 249. — *Lygus Sallaei* Dist., Biol. Centr.-Amer., Rhynch. Heter., Tab. XXIII, Fig. 2, 3.

Mexico, D. Sallé (Mus. Holm.).

Caput basi pronoti circiter dimidio angustius, ab antico visum (♂) latitudine verticis oculique unici paullo longius, a latere visum fortiter nutans, altitudine sat multo brevius, gula obliqua peristomio aequa longa; vertice (♂) oculo aequa lato, aequaliter marginato. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, articulo primo apicem xyphi prosterni subattingente. Antennae articulo secundo margine basali pronoti paullo breviore, ultimis simul sumtis hoc brevioribus. Pronotum latitudine basali circiter dimidio brevius, lateribus rectis. Hemielytra (♂) abdomen longe superantia, pronoto circiter $4\frac{1}{2}$ longiora. Tarsi (intermedii) margine inferiore articuli primi eidem secundi aequa longo.

Cyrtocapsidea irrorata Reut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., XLIX, 1906—1907, Nr. 5, p. 9.

Orizaba, 5 Maji.

Poeciloscytus obscurus Uhl.

Orizaba, mm. Februarii et Maji; Cornu Vacca.

Div. Restheniaria m.

Platytylus plagiger Stål.

Orizaba, m. Junii.

Platytyllus intercidendus (Dist.).

Cuerno Vacca, mm. Augustii et Octobris.

Opistheuria nov. gen.

Corpus cum hemielytris oblongo-obovatum, opacum, inpunctatum, superne pilis brevibus vel brevissimis mollibus erectis vel suberectis dense pilosum; capite fortiter nutante, basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, strictura apicali pronoti distinete latiore,