

trapeziformi, lateribus rectis, margine basali truncato, disco versus apicem leviter declivi, planiusculo, callis parum discretis; hemielytris maris abdomen longe superantibus, cuneo oblongo-triangulari, membrana biareolata; xypho prosterni convexo; femoribus puncto anteaapicali marginis superioris setifero instructis; tibiis nigro-spinulosis, spinulis e punctis minutis nascentibus.

A genere *Psallus* Fieb., Reut. capite infra oculos omnium brevissime producto, clypeo haud prominentे, depresso, basi cum fronte confluente articuloque primo rostri caput haud superante divergens; a genere *Sthenarus* Fieb., Reut. vertice aequali nec marginato nec margine tenui acuto, oculis granulatis, antennis articulo primo apicem clypei longius superante, secundo longiore, a genere *Campylomma* Reut., cui structura capitis et oculorum nonnihil similis, oculis distincte exsertis, granulatis, capite cum iis apice pronoti multo latiore, margine verticis haud acuto, antennis aliter constructis distincta. (Pedes postici desunt).

Orizaba luridipennis n. sp. Nigro-picea, pilis facillime divellendis argenteis vestita, hemielytris luridis, angulo exteriore apicali corii cuneoque dilute fuliginosis, membrana cum areolis fuliginoso-fumata, venis fuliginosis, macula inter apicem cunei et areolam minorem pallida; antennis maris nigro-piceis, articulo secundo lineariter incrassato, primo crassitie subaequali, pilosulo, basin versus lurido; femoribus picescentibus, apice sat late, tibiis tarsisque luridis, tibiis spinulis nigris e punctis minutis fuscis nascentibus, tibiis anterioribus apice late in punctatis. ♂. Long. 3, lat. fere 1 mm.

Orizaba, m. Decembris, unicum mas.

Caput (♂) cum oculis basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustius, ab antico visum latitudini verticis oculique unici longitudine subaequale; vertice oculo paullo angustiore. Antennae articulo secundo margini basali pronoti aequo longo. Pronotum latitudine basali duplo brevius, apice longitudine distincte angustiore. Hemielytra (♂) abdomen longe superantia. (Pedes postici desunt.)

Plesiodemidea nov. gen.

Corpus (♀) oblongum, nitidulum, saltem inferne (lateribus pectoris) squamis metallicis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, a supero viso pronoto paullulum breviore, nutante, ab antico viso transverso, a latere viso altitudine distincte breviore, vertice aequali, fronte declivi, clypeo sat leviter prominentе, compresso, angusto, basi ejus infra medium capitis a latere visi posita, genis humilibus, gula haud distinguenda; oculis (♀) ultra angulos apicales pronoti modice prominentibus, sublaevibus; antennis (♀) ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei vix attingente, secundo brevi, versus apicem sensim incrassato; pronoto trapeziformi, fortiter transverso, lateribus rectis, disco subhorizontali, margine basali truncato; scutello pronoto aequo longo, planiusculo; hemielytris vena clavi venaque cubitali corii distinguendis, cuneo leviter declivi, latitudine basali paullo longiore, membrana biareolata; alis areola hamo distincto a vena decurrente paullo remoto; pedibus breviusculis, femoribus puncto marginis superioris anteaapicali setifero instructis, posticis brevibus, fortiter incrassatis, tibiis nigrospinulosis, tarsis breviusculis.

Plesiodemidea fusciceps n. sp. Superne livido-testacea, capite, apice pronoti scutelloque nigro-fuscis; membrana leviter fumata; pectore fusco, orificiis testaceis, ventre obscure testaceo, dense breviter argenteo-pubescente; coxis fuscis, femoribus