

Capsidæ Argentineæ.

Kritische und neue argentinische Capsiden

beschrieben von

O. M. REUTER.

Meine ursprüngliche Absicht war alle in europäischen Sammlungen aufbewahrten argentinischen Capsiden, von denen ich schon ein ziemlich reiches Material zusammengestellt hatte, ausführlich zu beschreiben. Eine Augenkrankheit, die leider in vollständige Blindheit resultiert hat, hat mich genötigt, darauf zu verzichten. Ich finde es jedoch nicht unnutzlich die schon fertigen Beschreibungen zu veröffentlichen, weil sie teils mehr oder weniger kritische Arten betreffen, die bisher nicht genügend genau beschrieben worden sind, teils solche, die ich als Typen neuer Gattungen aufgefasst habe, und endlich auch zwei neue noch unbeschriebene Arten.

Div. Bryocoraria.

Aspidobothrys ruficeps (Berg).

Oblongo-ovatus, niger, capite toto, solum oculis exceptis, pronoto, prostethio, pleuris mesostethii basique clavi et corii, hac angustissime, rubris, pronoto macula sat magna oblonga media discoidali, postice basin subattingente, antice

inter callos producta nigra; limbo costali corii et cunei lido; rostro rubro, apicem versus picescente, apicem coxarum anticarum attingente, articulo primo caput superante, secundo primo aequo longo, parallelo, ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus; capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, oculis transversim positis, vertice oculo circiter triplo latiore, apice medio obtuse impresso; antennis articulo primo extrema basi rubro, secundo latitudini verticis interoculari aequo longo et primo crassitie subaequali; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ breviore, callis medio sat distantibus, disco inter callos late depresso, disco postico sat convexo, versus apicem modice declivi, laevi vel omnium obsoletissime remote punctulato; hemielytris retrorsum leviter ampliatis, sublaevis vel omnium obsoletissime punctulatis; membrana fusca; pedibus totis nigris. ♂. Long. 6, lat. $2\frac{2}{3}$ mm.

Eccritotarsus ruficeps Berg, Hem. Arg. p. 130, 189.

La Plata, D. Dr C. Berg. (Mus. Helsingf.).

A speciebus brasiliensibus a me descriptis (vide Ann. Naturh. Hofmus. Wien, XXII, p. 33—36), macula discoidali pronoti majore, hemielytris sublaevis, limbo costali disco-lore mox distinguendus.

Pachymerocerus nov. gen.

Corpus ovatum vel oblongo-ovatum, cum hemielytris convexum, nitidum; capite laevi, basi pronoti circiter dimidio angustiore, a supero viso pronoto dimidio breviore, inter antenas obtusangulariter rotundato, vertice convexiusculo, aequali; capite ob antico viso fere aequo longo ac lato, a latere viso altitudine circiter dimidio breviore, fronte fortiter declivi, convexiuscula, clypeo perpendiculari, sat prominente, a latere viso subparallelo, basi a fronte bene discreto, ipsa basi in medio vel mox supra medium capitum a latere visi posita, angulo faciali recto, genis altissimis, gula valde obliqua; rostro medium mesosterni paullo superante, articulo primo basin capitum attingente, secundo duobus ultimis parum breviore, his longitudine subaequalibus; antennis mox supra apicem oculorum interne insertis, articulis duobus primis validis,

crassitie aequalibus (σ) vel secundo primo paullo graciliore (φ), primo apicem clypei vix attingente et latitudini verticis interoculari longitudine subaequali vel hac breviore, secundo primo magis quam duplo longiore; pronoto leviter transverso, apice quam basi fere $2/3$ angustiore, strictura apicali optime discreta, hac articulo primo antennarum graciliore, callis minutis, ne minime quidem convexis, transversis, tertiam apicalem partem pronoti haud superantibus, usque in latera extensis et marginibus levius impressis, disco pone callos sat fortiter convexo, versus apicem sat fortiter declivi, utrinque ad angulos posticos levissime impresso, margine basali latisime rotundato, basin scutelli obtegente; scutello pronoto fere dimidio breviore, impressione magna triangulari basali instrueto; hemelytris convexiusculis, lateribus late rotundatis, embolio lineariter incrassato, reflexo, cuneo fortiter declivi, latitudine basali parum longiore; membrana area magna triangulari; coxis anticis brevibus; pedibus mediocribus, tibiis muticis, tarsis articulo primo fisso, secundum fere ad medium inclidente, hoc tertio longitudine subaequali; tertio elongato, versus apicem modice dilatato.

Genus corpore cum hemelytris convexo et nitido, capite parvulo, rostro breviusculo, antennarum articulis duobus basalibus valde incrassatis, secundo latitudine capitinis longiore, pronoto basin versus fortiter dilatato et convexo, strictura apicali distinctissima articulo primo antennarum multo graciliore, callis minutis parum distinctis optime distinguendum.

Typus generis: *Eccritotarsus fairmairei* Stål.

Pachymerocerus purpurissatus (Berg).

Purpureo-rufus, nitidus, capite, antennis, strictura apicali callisque pronoti, pectore, abdomen, coxis basique femorum, scutello, clavo, basi limboque corii interiore juxta suturam clavi usque in angulum interiore cunei membranaque nigris; tibiis anticis saepe apicem versus tarsisque lividis, apice earum articuloque ultimo tarsorum nigro-fuscis; vertice oculo fere $2 \frac{2}{3}$ latiore; articulo primo antennarum latitudini oculi a supero visi aequa crasso, latitudine interoculari ver-

ticis paullo breviore, basi tenuiter constricta pallido, secundo primo aequa (♂) vel fere aequa (♀) crasso, primo paullo magis quam duplo (♀) vel duplo et dimidio (♂) longiore; pronoto disco postico dense punctulato; scutello hemielytrisque tenuiter cinereo-pubescentibus, his laevibus. ♂ ♀. Long. $3\frac{1}{4}$, lat. hemielytrorum $1\frac{1}{2}$ mm.

Eccritotarsus purpurissatus Berg, Hem. Argent., 1879, p. 131, 292.

Buenos Ayres, 2 spp., Cotyti auctoris (Mus. Helsingf.).

Pachymerocerus erythronotus Bergr.

Purpureus, nitidus, capite, antennis abdomineque nigris, clavo membranaque fusco-nigricantibus, tarsis lutescentibus, articulo ultimo nigro-fusco; vertice oculo circiter $2\frac{3}{4}$ latiore; articulo primo antennarum apice latitudini oculi a supero visi aequa crasso (♀) vel crassiore (♂), latitudine interoculari verticis breviore (♀) vel huic aequa longo (♂), basi tenuiter constricta pallido, secundo aequaliter incrassato, solum ima basi extremoque apice graciliore, primo circiter duplo et dimidio longiore et hoc paullo graciliore (♀) vel huic aequa crasso (♂), nonnihil compresso; pronoto disco postico sublaevi; scutello hemielytrisque tenuissime cinereo-pubescentibus. ♂ ♀. Long. $3\frac{4}{5}$ —4, lat. hemielytrorum $1\frac{2}{3}$ mm.

Eccritotarsus erythronotus Berg, Hem. Arg., Add. et Emend., 1884, p. 81.

Buenos Ayres, 5 spp. e collectione Signoreti (Mus. Vindob.).

Caulatops¹⁾ puncticollis Bergr.

Oblonga, capite apiceque pronoti rufescentibus, pronoto cetero, prosterno, articulo primo antennarum, rostro pedibusque cum coxis pallide ochraceis, articulo ultimo tarsorum fusco; scutello et hemielytris obscure griseoscenti-cyaneis, griseo-pubescentibus, embolio pallido, sordide lutescente; meso-

¹⁾ Hoc genus in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, XXII, p. 136 accurate descripti.

et metastethio nec non abdomine nigricantibus; capite basi pronoti vix $\frac{1}{6}$, angustiore, ab antico viso latitudini frontis aequo longo, vertice horizontali, oculo quadruplo latiore, genis oculis altioribus; oculis fuscis, sat parvulis, sat fortiter retrorsum vergentibus; pronoto latitudine circiter $\frac{1}{3}$ breviore, lateribus levissime sinuatis, callis mediocribus retrorsum obliquis, medio sat late distantibus, disco postico subhorizontali, transversim convexiusculo, crebre sat fortiter punctato, utrinque ad angulum basalem impresso; hemielytris laevigatis, membrana cum venis aequaliter griseo-fumata. ♂. Long. $3\frac{2}{3}$, lat. hemielytrorum $1\frac{2}{5}$ mm.

Bergr. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 33.

Buenos Ayres, 1 ♂ specimen typicum (Mus. Helsingf.).

Div. Miraria.

Dolichomiris Reut.

Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXV, 1882, p. 29. Ann. Soc. ent. France LXI, 1892, p. 392. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIV, 1902, p. 158. *Eioneus* Dist. Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter., p. 416.

Corpus valde elongatum, parallelum, glabriuscum; capite porrecto, horizontali, latitudine longiore, a supero viso pronoto haud vel parum breviore, vertice sulco longitudinali instructo, fronte apice ultra basin clypei in lobulum acutangulariter prominulum producta; capite a latere viso fere parallelogrammico et altitudine saltem duplo longiore, clypeo fortiter prominente, margine antico sub angulo acutiusculo retrorsum vergente, basi a fronte impressione acuta discreto, angulo faciali obtuso, gula peristomio aequo longa, horizontali; oculis parum excertis, a supero visis pronoto contiguis, semi ovalibus, a latere visis orbicularibus, orbita interiore apicem versus fortiter divergentibus; rostro articulo primo longitudine capitis; antennis sat longe ante oculos insertis, articulo primo longo, secundo primo haud duplo longiore et duobus ultimis simul sumtis breviore, basin versus incrassato;

pronoto scutelloque inpunctatis, horizontalibus, linea media subelevata longitudinali instructis, illo latitudine basali longiore, lateribus acutis, antice vel totis marginatis, margine basali profunde arcuato-sinuato; apice dimidia basi latiore, strictura apicali destituto; scutello basi detecto; cuneo valde elongato, fractura ejus longe infra angulum interiorem basalem membranae posita; membrana biareolata, areola maiore valde elongata, angulo interiore apicali fortiter acuta; coxis anticis brevibus, basin mesosterni vix attingentibus; mesosterno longo; horizontali; metastethio orificiis rimam tenuem transversalem formantibus, hac rima antice late et alte, postice tenuissime marginata; femoribus linearibus, tibiis anterioribus interne spinulosis.

Genus structura capitis, antennarum et pronoti mox distinguendum.

Dolichomiris costicollis (Berg).

Pallide stramineus, opacus, capite linea percurrente lineisque duabus lateralibus, pronoto lineis duabus mediis percurrentibus valde appropinquatis fuscis; scutello fuscescente, carina media marginibusque flavidis; inferne adhuc pallidior, utrinque vitta tenui laterali capitis, pectoris saepeque etiam ventris obscure sangvinea; rostro coxas intermedias attinente; antennis articulis duobus basalibus dilute fulvis, rufo-irroratis et punctatis, articulo primo capite et pronoto simul sumtis distinete paullo longiore, brevissime puberulo, secundo primo circiter dimidio longiore, tertio basali aequo longo; pedibus puberulis, tibiis posticis laete rufis. ♂. Long. 7—8, lat. 1—1 $\frac{1}{4}$ mm.

Miris costicollis Berg, Hem. Arg., p. 118, 148. — *Tigonotylus* id. Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., p. 63, 65. — *Dolichomiris* id. Reut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIV, p. 159.

Argentina: Buenos Ayres. Specimen cum typo ab auctore comparatum (Mus. Helsingf.).

A. D. *linearis* Reut. antennis aliter constructis, non nisi omnium brevissime puberulis oculisque minoribus mox distin-

guendus. Caput a supero visum latitudine basali cum oculis saltem $\frac{1}{3}$ longius, vertice (φ) oculo magis quam duplo latiore. Oculi parvuli, feminae a latere visi medium altitudinis capitidis haud attingentes. Pronotum lateribus totis anguste marginatis. Scutellum sulco transversali prope basin instructum. Membrana brevis et angusta, apicem cunei solum paullo superans.

Stenodema insuave (Stål).

Elongatum, albicans vel pallide griseo-flavescens, nitens; capite utrinque lateribus, pronoto utrinque vitta laterali corpore que inferne utrinque vitta laterali percurrente fuliginosis, corio interne magis minusve fuscescens; capite a supero viso latitudine cum oculis fere dimidio longiore, apice frontis basi clypei altiore, perpendiculari; capite a latere viso altitudine basali fere duplo longiore; clypeo basi a fronte impressione sub obtusa discreto; antennis corpori hemelytris exceptis, longitudine subaequalibus, fuscis, articulo primo saepe albido, pronoto fere aequo longo, dense molliter longius fusco-pilososo, pilis crassitiei articuli longitudine aequalibus vel subaequalibus, secundo primo $2\frac{3}{5}$ (φ)— $2\frac{1}{2}$ (σ) longiore, solum basi pilosulo (σ) vel ultra medium, basi longius apicem versus sensim brevius fusco-pilosoo (φ), articulis duobus ultimis simul sumtis secundo paullo brevioribus, quarto tertio circiter $\frac{2}{7}$, breviore; pronoto latitudini basali aequo longo, lateribus sinuatis; apice dimidia basi paullo latiore, disco parce sat subtiliter punctato, linea longitudinali laevigata parum distincta; scutello pronoto paullo breviore, parce punctato, apice carinula longitudinali instructo; hemelytris pronoto aequo latis, abdomen parum superantibus, obsolete. parce punctulatis, membrana albicante; femoribus posticis apice haud constrictis, tibiis posticis subrectis, pilis exsertis albidis crassitie tibiae distincte longioribus pilosis (φ) vel solum pilis brevissimis asperulis (σ); tarsis posticis articulo primo duobus ultimis simul sumtis fere longiore. ♂ ♀. Long. 7—10, lat. $1\frac{3}{4}$ —2 mm.

Miris insuavis Stål, Rio Jan. Hem. I, p. 45, t. Berg, Hem. Arg., p. 117, 145.

Brasilia: Rio de Janeiro, sec. D. Stål; Argentina: Buenos Ayres (Mus. Helsingf., coll. Sign.); Uruguay: Montevideo (coll. Sign.); Tierra del Fuego, sec. Berg.

Species ab omnibus reliquis corpore nitidissimo, pronoto scutelloque parce punctatis structuraque tarsorum mox distinguenda. Color variabilis, albido-testaceus — nonnihil fuscescens. Caput interdum apice fuscescens (sec. Berg).

Stenodema dohrni (Stål).

Elongatum, capite a supero viso latitudine postica cum oculis paullo longiore, fronte supra basin clypei ne minime quidem prominula, apice clypeo paullulum altiore, clypeo a fronte impressione obtusissima discreto; antennis corpore fere longioribus, articulo primo capite a supero viso parum longiore, dense subtiliter pubescente, pilis essertis destituto, reliquis subglabris, secundo linearis, primo circiter duplo longiore et duobus ultimis simul sumtis distincte breviore; pronoto latitudine postica fere $\frac{1}{3}$ breviore, apice dimidia basi distincte latiore, disco horizontali, dense sat subtiliter punctato, linea media longitudinali laevigata distincta, callis sat elevatis, medio antice cum area laevigata transversali confluentibus, hac linea ante apicali transversim impressa terminata; scutello crebre punctato, linea laevigata longitudinali instructo; hemelytris pronoti latitudine, abdomini aequae longis (φ); femoribus posticis apice haud constrictis, tibiis posticis rectis, pilis tenuibus sub angulo acuto excertis parcius pilosis, his pilis crassitie tibiae fere longioribus; tarsis posticis articulo tertio primo circiter $\frac{1}{4}$ breviore. φ . Long. 6—7, lat. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{4}{5}$ mm.

Miris Dohrni Stål, Freg. Eug. resa, Hem., p. 254, 88. Berg, Hem. Arg., p. 118, 147. Nova, Hem. Arg. et Urug., p. 78, 96.

Patagonia: (Coll. Sign.) Port Famine (Mus. Holm.).

St. holsato (Fall) affine, differt statura magis elongata, antennis cepiteque nonnihil longioribus, pronoto breviore,

hemielytris pronoto haud latioribus. Colore nonnihil varians. Plerumque dilute griseo-flavescens, lateribus capitis, pronoto, linea media longitudinali lateribusque exceptis, scutello, linea longitudinali excepta, hemielytrisque fuscous, his limbo lato lateral i pallido; in ferne cum pedibus griseo-flavescens, pectore utrinque vitta fuscous signato, femoribus seriatim fusco-punctatis. Sec. D. Berg hemielytra interdum sordida fuscous unicolora, caput nigricans. Mas quam femina angustior et plerumque obscurior, articulo primo antennarum crassiore et saepe nigricante.

Ophthalmomiris Reut. et Berg.

Berg., Add. et Emend. Hem. Arg., p. 64.

Corpus elongatum, duriusculum; capite breviusculo et latiusculo, a supero viso latitudine cum oculis paullo breviore et pronoto circiter $\frac{2}{5}$ breviore, vertice horizontali, sulco longitudinali instructo, fronte apicem versus sensim declivi; capite a latere viso altitudine basali parum longiore, clypeo retrorsum vergente, basi cum fronte subconfluente, angulo faciali recto, genis humilibus, gula horizontali; oculis subbasalibus, granulatis, magnis, a supero visis orbicularibus, a pronoto leviter remotis, a latere visis in genas longe extensis, orbita interiore in vertice late rotundatis, dein fortiter sinuatis; rostro coxas posticas attingente — subsuperante; antennis ante sinum orbitae interioris oculorum insertis, articulo primo elongato, levissime incurvato; pronoto capite longiore, latitudini posticae fere aequo longo, apice quam basi dimidio angustiore, utrinque ad angulum apicalem impresso, lateribus levissime bisinuatis, marginibus acutiusculis, margine basali subtruncato, disco postico punctato, sat convexo et antrorsum sat declivi, callis distinctis, transversis, medio distantibus, $\frac{2}{5}$ apicales pronoti haud superantibus; scutello pronoto breviore, punctato; hemielytris duriusculis, in distinete ruguloso-punctulatis, brevissime puberulis, cuneo oblongo-triangulari, fractura longe infra angulum interiorem basalem membranae posita, membrana biareolata, areola majore valde elongata, angulo apicali interiore acuto; meso-

sterno sat convexo; metastethio orificiis sat magnis, obliquis, interne longius, externe brevius marginatis; coxis anticis brevibus, basin mesosterni vix superantibus; pedibus pilosis, femoribus posticis ubique aequae crassis, tibiis posticis subrectis, tarsis posticis articulo primo duobus reliquis simul sumtis longitudine subaequali.

A genere *Stenodema* Lap., Reut., cui affinis, structura capitis et oculorum, disco postico pronoti versus callos fortius convexo-declivi, mesosterno magis convexo, orificiis metastethii aliter constructis divergens.

Ophthalmomiris reuteri Berg.

Pallide luteus vel flavo-testaceus, antennis, capite apice et collo, pronoto utrinque vitta lata retrorsum latiore, hemelytris interne, mesosterno, dorso abdominis, ventre utrinque vitta percurrente laterali sordide rubris, lurido-fuscis vel rufescenti-fuscis; pedibus virescenti-testaceis, tibiis apicem versus tarsisque; nec non interdum margine antico femorum posticorum luteis vel picescentibus. Long. $8\frac{1}{2}$ —9, lat. $1\frac{4}{5}$ mm.

Ophthalmomiris Reuteri Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., p. 65, 66.

Argentina: Buenos Ayres (Mus. Vindob.); Uruguay, sec. D. Berg.

Caput maris vertice inter oculos oculo distincte angustiore. Antennae corpori aequae longae, articulo primo pronoto parum breviore, sat parce longius piloso, interne et inferne flavido, superne et externe obscure rubro, sequentibus rufescenti-fuscis, brevissime pubescentibus, secundo primo circiter $2\frac{2}{3}$ longiore. Pronotum crebre punctatum. Scutellum parcium punctatum. Hemelytra parcium obsoletius punctata.

Collaria Prov.

Canad. Nat. IV, 1872, p. 79. — *Trachelomiris* Reut.,
 Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 61. *Nabidea* Uhl., Proc.
 Bost. Soc. Nat. Hist. 1878, p. 397.

Corpus elongatum, opacum; capite porrecto, a supero viso pronoto saltem aequo longo, cum oculis basi pronoti aequo lato vel hac paullo angustiore; oculis fere in medio laterum capitidis positis, excertis, a supero visis orbicularibus; vertice inter oculos impressione transversali et sulco tenui medio longitudinali instructo; collo pone oculos subparallelo: capite a latere viso altitudine longiore, ad oculos nonnihil dilatato, fronte leviter declivi, clypeo prominente, nitido, basi tumidula et arcuata, cum fronte confluente et in plano apicali hujus posita, margine antico perpendiculari, angulo faciali recto, genis sat altis, bucculis sat elevatis, gula longa, horizontali; rostro apicem coxarum posticarum subbattingente, articulo primo caput paullo superante; antennis gracilibus, articulo primo capite breviore vel huic longitudine subaequali, tribus ultimis gracilibus, secundo lineari, primo magis quam duplo — triplo longiore et duobus ultimis simul sumitis breviore; pronoto $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$ anticis constricto, dein basin versus ampliato, margine basali truncato, angulis basalibus saepe subreflexis, disco postico plerumque altius convexo, callis elevatis, ubique bene determinatis, suborbicularibus, medium longitudinis pronoti subbattingentibus, margine postico rotundatis, medio disjunctis; apice pronoti basi dimidio vel fere dimidio angustiore, strictura spuria a margine antico callorum formata, angulis anticis nodulo instructis, lateribus sat obtusis, antice ad callos crasse et breviter marginatis; scutello basi detecto, basi utrinque foveola marginali instructo; hemielytris cuneo elongato-triangulari, fractura ejus sat longe infra angulum interiorem basalem membranae posita, membrana biareolata, areola majore elongata, parallela, angulo ejus interiore apicali obtuso; xypho prosterni triangulare, plano, lateribus marginato; mesosterno convexiusculo, metastethio rima orificiorum transversali tenui, angulo ejus exteriore in tuberculum alte elevato; coxis anticis brevibus;

femoribus longis linearibus, tibiis spinulis destitutis, tarsis posticis articulo primo duobus ultimis simul sumtis saltem aequo longo, terebra feminae medium ventris haud attinente.

Genus structura capitinis et pronoti, oculis fere in medio laterum capitinis positis facilime distinguendum.

Collaria scenica (Stål, Berg).

Superne obscure fusca vel nigro-fusca, breviter pallido-pilosula, capite medio magis minusve testaceo; pronoto marginibus apicali et basali, linea percurrente longitudinali mediana maculaque utrinque ad angulum basalem testaceis, hac macula maculam aliam aterrimum includente; apice scutelli maculisque obsoletis partis basalis corii testaceis; hemielytris limbo tenui exteriore corii et cunei maculaque communi marginis apicalis corii basalisque cunei lividis; pectore fusco vel nigro-fusco, ventre livido, pallido-pilosulo, lateribus nigro-fusco limbato; antennis flavo-testaceis, parcius et brevius semi-adpressim pilosis, articulo primo capite a supero viso circiter $\frac{2}{5}$ breviore, basi et apice nigro-fusco, secundo primo circiter $2\frac{3}{4}$ longiore, apicem versus cum ultimis nigro-fusco; pedibus flavo-testaceis, longe pilosis, femoribus seriatim fusco-maculatis, tarsis articulo ultimo fusco; capite basi pronoti perparum angustiore, vertice (φ) oculo paullo minus quam dimidio angustiore; pronoto disco postico leviter convexo, crebre punctato, angulis basalibus reflexis; hemielytris feminae abdominis longitudine. φ . Long. 6, lat. $1\frac{2}{5}$ mm.

Miris scenicus (pars) Stål, Freg. Eug. resa, Hem., p. 254, 90 (1859). Berg, Hem. Arg., p. 118, 146, sec. spec. auctoris.

Argentina: Buenos Ayres (Mus. Helsingf. et Vindob.).

Div. Capsaria.

Phytocoris pallidus Berg.

Pallide sulphureus, sat longe flavo-pubescent; strictura apicali pronoti utrinque punctis duobus lateralibus fuscis notata, scutello lineis duabus longitudinalibus percurrentibus mediis tenuibus parallelis fuscescentibus, his vittam tenuem pallidam includentibus, membrana hyalina, venis pallide sulphureis, versus apicem griseo-irrorata; ventre seriatim fuscocentri-maculato; femoribus posticis versus apicem dilute fuscocenti-conspurcatis, tibiis innotatis, pallido-spinulosis; antennis colore corporis, articulo primo pronoto paullulum longiore, robusto et secundo fere duplo crassiore, longe pubescente sed setis rigidis destituto, secundo primo duplo longiore; capite a latere viso altitudini basali fere aequa longo, clypeo usque a basi in angulum rectum prominente, basi ejus alte, fere in $\frac{1}{5}$ basali altitudinis a latere visae posita. ♂. Long. $5\frac{1}{3}$, lat. $1\frac{2}{3}$ mm.

Resthenia pallida Berg, Hem. Arg., p. 291. — *Phytocoris?* *pallidus* Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., p. 70.

Plura specimina legit D. Jensen-Haarup (Mus. Helsingfors).

Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ augustius, a supero visum pronoto parum brevius, ab antico visum latitudine verticis oculique unici parum longius, clypeo retrorsum vergente; vertice oculo paullulum magis quam dimidio latiore (♀). Oculi fusco-nigri, granulati, a supero visi suborbiculares (♀). Rostrum apicem coxarum posticarum attingens. Anterinae articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{3}{7}$, longiore. Tibiae spinulis concoloribus, tenuissimis, setiformibus, crassitie tibiae sat multo longioribus.

Garganus flavovarius n. sp.

Piceo-niger, tenuiter flavicanti-pubescent, nitidulus; pronoto vitta media discoidali maculaque utrinque pone callos transversali, marginem lateralem attingente, scutello, basi excepta, clavo vix tertia parte apicali, corio commissura, mar-

gine toto exteriore, vitta lata marginali $\frac{3}{5}$ basales occupante maculaque sat magna subquadrata anguli exterioris, cuneo, apice excepto, pectore marginibus acetabulorum, ventre disco femoribusque dimidio basali stramineis; antennis rufo-ferrugineis, articulo secundo ante medium annulo lato stramineo, magis quam $\frac{2}{5}$ apicalibus nigris et levissime incrassatis (ulti-
mi desunt), articulo primo pronoto capiteque simul sumtis solum paullo et articulo secundo paullo magis quam $\frac{2}{5}$ breviore, femoribus apicem versus late fusco-ferrugineis, tibiis tarsisque stramineis, illis sat tenuiter nigro-spinulosis. ♀:
Long. 5, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Unicum specimen legit D. Jensen-Haarup (Mus. Helsingfors).

Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustius, a supero visum latitudine circiter $\frac{3}{7}$ brevius, vertice (♀) oculo aequa lato, utrinque impressione rotundata instructo; ab antico visum latitudini cum oculis aequa longum, loris arcuatis. Rostrum flavo-ferrugineum, segmentum secundum ventrale attingens. Antennae articulo secundo margine basali pronoti circiter dimidio longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, marginibus lateralibus latissime sinuatis, disco versus apicem leviter declivi, strictura apicali callisque circiter $\frac{2}{5}$ apicales occupantibus, illa articulo primo antennarum aequa crassa, margine basali medio latissime subtruncato. Scutellum basi detectum. Hemelytra commissura scutello duplo longiore. Membrana obscure fuliginosa, areola minore ma-
culaque ad apicem cunei dilutioribus.

An *Ischnias saltensis* Berg, An. Soc. Cient. Arg., XXXIV,
1892, p. 193?

Poeciloscytus ocellaris Sign.

Capsus ocellaris Sign., Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863,
p. 527, sec. spec. typ.

Resthenia picea Berg, Anal. Soc. Cient. Arg. VI, 1878,
p. 275, 158. — Hem. Arg. p. 125, 158.

Poeciloscytus id. Berg, Addenda et Emend. Hem. Ar-
gent., p. 76, 81, sec. spec. typ. Nov. Hem. Arg. et Urug.,
p. 91, 114.

In *Xanthio spinoso*, sec. D. Berg. Chili (Mus. Vind.). Uruguay: Montevideo, sec. D. Berg; Argentina: Buenos Ayres, los Conchas, Chascomus, el Tandil, sec. D. Berg (Mus. Helsingfors).

Species colore maxime variabilis:

Var. variegata m.: Inferne tota straminea, superne straminea, vertice maculis duabus marginis postici, fronte maculis duabus magnis semi-ovalibus marginibusque clypei, pronoto plagiis duabus magnis disci postici saepe confluentibus, scutello, macula magna ovali apicali excepta, clavo interne, corio, basi limboque exteriore exceptis, nec non disco cunei picescenti-fuscis; antennis articulo primo nigro, secundo stramineo, apicem versus cum ultimis nigrante; pedibus stramineis, femoribus annulis duobus ante apicalibus fuscescensibus, tibiis fusco-spinulosis, tarsorum articulo ultimo nigro-fusco; venis membranae dilute fumatae stramineis. ♀.

Var. limbata m.: Inferne nigricans, marginibus segmentorum anguste stramineis; superne nigra, capite macula verticis utrinque ad oculum maculisque nonnullis apicalibus, margine basali pronoti tenuiter (saltem feminae, maris plerumque concolore), apice scutelli, limbo exteriore commissura brevi margineque apicali corii, limbo laterali (♀) vel solum apice vel apice margineque interiore (♂) cunei stramineis, venis membranae fumatae sordide flaventibus; antennis nigris, articulo secundo medio plerumque late fusco-ferrugineo; pedibus stramineis, femoribus medio annulisque duobus ante-apicalibus, tibiis basi anguste tarsisque nigro-piceis, his articulo secundo fusco-ferrugineo. ♂ ♀.

Var. picea: Nigra vel nigro-picea, capite macula utrinque verticis ad oculum, macula utrinque ad basin clypei interdumque etiam vittula media frontis, scutello feminae apice (maris saepe toto concolore), corio angulo apicali, cuneo apice venisque membranae sordide stramineis, cuneo interdum toto rufescenti-piceo, antennis ut in praecedente; femoribus saepe totis piceis, tibiis tarsisque ut in praecedente. ♂ ♀.

Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, ab antico visum latitudini cum oculis (♀) vel latitudini verticis oculique unici (♂) aequo longum; vertice oculo circiter dimidio (♂) vel duplo (♀) latiore. Rostrum coxas posticas attingens. An-

tennae articulo secundo margini basali pronoti aequo longo (φ) vel hac longiore (σ). Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ brevius, disco postico crebre transversim strigoso; callis sat elevatis, marginibus eorum omnibus fortius impressis. Scutellum strigosum. Hemelytra dense subtiliter punctulata. $\sigma \varphi$. Long. $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{3}$, lat. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm.

Div. Restheniaria.

Heteroscytus nov. gen.

Corpus oblongum, leviter nitidulum, superne subglabrum; capite verticali, basi pronoti fere $\frac{2}{5}$, angustiore, a supero viso pronoto fere dimidio breviore et strictura apicali hujus distinctissime latiore, longitudine sua duplo latiore, margine antico obtusangulariter rotundato, vertice modice lato, immarginato, sulco longitudinali destituto; capite ab antico viso latitudini cum oculis aequo longo, loris haud prominentibus, a latere viso altitudine sat multo breviore, fronte convexiuscula, apicem versus perpendiculari, clypeo sat fortiter prominente, basi ejus in medio capitinis a latere visi posita, margine antico basi arcuato, dein perpendiculari, angulo faciali recto, loris inferne vix discretis, genis oculo aequo altis, gula brevissima; oculis mediocribus, laevibus, pronoto contiguis, exsertis, a supero visis sub-orbicularibus vel levissime transversis, margine interiore versus apicem sat fortiter divergentibus et leviter sinuatis; rostro apicem coxarum posticarum attingente, articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis sat gracilibus, subtilissime et brevissime nigro-pubescentibus, ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo capite ab antico viso breviore, secundo circiter $\frac{2}{5}$ basalibus linearib; dein versus apicem incrassato, apice articulo primo aequo crasso, duobus ultimis simul sumtis secundo aequo longis, tertio basi secundi aequo crasso; pronoto trapeziformi, latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ breviore, apice quam basi dimidio angustiore, strictura apicali medio articuli primi antennarum parum crassiore, lateribus graciliore, callis transversis,

strictura longioribus, tertiam apicalem partem longitudinis pronoti haud superantibus, medio sat leviter distantibus, in latera minus longe extensis, limbo lateralí extra callos optime distinguendo, margine ejus sat obtuso, lateribus immarginatis, fere ad medium usque levius, dein fortius ampliatis, medio sinuatis, angulis basalibus subrectis, margine basali medio truncato, versus angulos obliquato, disco postico leviter convexiusculo, versus callos leviter declivi; scutello planiusculo, pronoto, strictura apicali hujus excepta, aequo longo, basi detecta; hemielytris lateribus pone medium corii levissime ampliatis, vena clavi elevata, clavo extra venam suturam versus declivi, commissura clavi scutello aequo longa, cuneo subhorizontali, latitudine basali paullo longiore, fractura sat longe infra angulum interiorem basalem membranae posita, membrana biareolata, areola majore angulo interiore apicali subrecto; areola alarum hamo tota destituta; xypho prosterni lateribus marginato; mesopleuris externe carina obliqua aream exteriorem apicalem terminante instructis; metastethio utrinque inter coxas intermedias et posticas rima nonnihil antrorum vergente et sulco nonnihil retrorum vergente, cum illa angulum acutum formante; coxis anticis medium mesosterni haud attingentibus; femoribus linearibus; tibiis subglabris, tenuiter distincte spinulosis, spinulis crassitiei tibiae longitudine subaequalibus; tarsis articulo primo reliquis paullo sed distincte crassiore posticis margine inferiore articuli secundi eodem solum paullo breviore.

Genus structura antennarum, pronoti et tarsorum bene distinctum, a gen. *Eurylomata* m., (typus: *Phytocoris gayi* Blanch.) cum quo lateribus pronoti sinuatis areolaque alarum hamo destituta congruit, oculis excertis, antennis aliter constructis, pronoto longiore et minus transverso, limbis ejus lateralibus antice ad callos immarginatis, articulo secundo tarsorum posticorum primo solum paullo breviore divergens.

Heteroscytus multifarius (Berg).

Niger, levissime nitidulus, loris, genis et bucculis, vertice marginibus ad oculos tenuiter maculaque mediana magis

minusve distincta, interdum deficiente, pronoto strictura apicali, limbis lateralibus antice ad callos vittaque tenui mediana discoidali, saepe postice abbreviata, scutello parte apicali, angulis basalibus exceptis, corio macula apicali in marginem exteriorem oblique producta, macula laterali segmenti ultimi abdominis, nec non meso- et metapleuris saturate aurantiacis, his saepe disco late nigris. Long. $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$, lat. 2 mm.

Resthenia multifarior Berg, Hem. Arg., 1879, p. 292, 377.

Resthenia (Resthenia) multifaria Berg, Add. et Emend. Hem. Arg., 1891—1892, p. 80, 99.

Argentina, D. Berg (Coll. Signoret).

Caput vertice oculo fere duplo latiore. Antennae articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{1}{3}$ breviore, secundo primo vix duplo longiore et margini basali pronoti aequo longo, tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ breviore, quarto tertio iterum $\frac{1}{3}$ breviore. Membrana nigricans. Alae albido-hyalinae, vivaciter iridescentes.

Div. Cyllocoraria.

Hyperhinocoris nov. gen.

Corpus oblongum (σ) vel ovale (φ), nitidum, laeve, tomento facile divellendo dense vestitum; capite fortiter nubante, pronoto angustiore, ante oculos angulato, vertice striis duabus obliquis antrorum vergentibus impressis, maris angusto, feminae modice lato; capite ab antico viso sat fortiter (φ) vel valde (σ) transverso, fronte cum basi clypei confluente, basi clypei apicem capitum formante; capite a latere viso altitudine breviore, clypeo toto usque a basi retrorum vergente, late compresso, parallelo, margine ejus antico marginem inferiorem capitum formante, angulo basali clypei recto, gula brevi, erecta, genis angustis (σ) vel mediocribus (φ); oculis exsertis, modice granulatis, orbita interiore sinuatis, maris maximis, valde convexis; rostro sat gracili, apicem coxarum anticarum paullo superante, articulis secundo et tertio aequo longis, quarto tertio nonnihil breviore; antennis ad apicem

oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo linearis, latitudine capitis parum (σ) vel paullo (φ) longiore; pronoto fortiter transverso, trapeziformi, lateribus rectis vel ante basin obsolete sinuatis, disco postico versus apicem convexo-declivi, marginibus callorum impressis, apice quam basi paullo (σ) vel distincte (φ) latiore, stricatura apicali destituto, margine basali recto; scutello pronoto fere aequo longo, parte basali detecta, declivi, apicali horizontali; hemielytris lateribus parallelis (σ) vel leviter rotundatis (φ), abdomen sat longe superantibus, commissura clavi scutello parum longiore, cuneo sat leviter declivi, latitudine basali parum (φ) vel modice (σ) longiore, membrana biareolata, apice areolae majoris angusto; areola alarum hamo destituta; xypho prosterni marginato; orificiis metastethii angustis; pedibus mediocribus, tibiis spinulosis, tarsis articulo primo secundo fere duplo longiore, tertio primo aequo longo, ungivculis late arcuatis, aroliis liberis, conniventibus.

Genus ab omnibus mihi cognitis clypeo toto usque a basi retrosum vergente, late compresso, parallelo, vertice strigis duabus obliquis antrorum convergentibus instructo, rostro brevi, oculis maris maximis corporeaque dense tomentoso, nec non structura tarsorum facillime distinguendum.

Hyporhinocoris tomentosus n. sp.

Mas et femina discolores; *mas*: superne piceo-niger, nitidus, aureo-tomentosus, pectore fusco, opaculo, abdomine griseo-flavo, hemielytris obscure caryophylleo-fuscis, dimidio exteriore corii cuneoque sordide pallide flaventibus; antennis (articuli duo ultimi desunt) pedibusque pallide flavo-testaceis, femoribus (saltem posticis) nigro-piceis; vertice oculo valde convexo saltem $1\frac{1}{3}$ angustiore; long. $4\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{3}{7}$ mm.; *femina*: flavo-testacea, capite, pronoto et scutello in fuscum vel ferrugineum vergentibus, dense albo-tomentosis, hemielytris dense aureo-tomentosis, unicoloribus, membrana flavicanti-fumata; ventre ferrugineo vel fusco-ferrugineo, dense pallide flavo-pubescente; antennis pedibusque pallide flaventibus; long. $4\frac{1}{4}$, lat. 2 mm.

Respublica Argentina, D. Jensen-Haarup (Mus. Helsingfors).

Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{5}$ (σ) — paullo magis quam $\frac{1}{4}$ (φ) angustius, a supero visum latitudine cum oculis $\frac{2}{5}$ (φ) — dimidio (σ) brevius. Antennae articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{5}$ (σ φ) breviore. Pronotum basi longitudine fere duplo latius. Tibiae innotatae, fusco-spi-nulosae.