

distinctissima. Tibiae anticae apice infuscato. Hemelytra maris longa, feminae abbreviata, membrana destituta, apice rotundata, vix magis quam $\frac{2}{3}$ basales dorsi abdominis tegentia.

20. **validus** (UHL.).

41. (32). Articulus secundus antennarum basi (interdum angustissime) nigra.

42. (43). Sordide albido-canescens, fusco- et nigricanti-variegatus, pronoto lateribus fasciaque tenui ante marginem basalem nigricantibus, disco fusco- vel nigricanti- vittato. Scutellum nigrum, nitidulum, angulis basalibus lineaque mediana longitudinali apicali albidis. Membrana dense hyalino- et nigricanti-conspersa. Articulus secundus antennarum basi angustissime nigricante, dein annulo angusto alioque infra medium albidis, primus linearis, gracilis, albido-variegatus, pronoto partique tertiae basali capit is a supero visi aequae longus, margine basali pronoti parum brevius. Vertex maris oculo aequae latus. Tibiae albido- et nigricanti-annulatae.

21. **palmeri** n. sp.

43. (42). Inferne nigro-fusci, superne obscure fusco-fumati, leviter nitiduli, pronoto linea media longitudinali partis apicalis saepeque apice scutelli anguste obsolete albidis, margine basali pronoti niveo. Membrana aequaliter fumata, solum macula ad apicem cunei hyalina vel etiam macula ante medium limbi exterioris nonnullisque discoidalibus sat obsoletis hyalinescentibus. Articulus antennarum secundus circiter $\frac{1}{6}$ basali nigra, dein annulo niveo sat angusto alioque infra medium niveis, articulus primus linearis. Tibiae niveo annulatae. Vertex oculo dimidio (♂) vel duplo (♀) latior.

44. (45). Major. Articulus primus antennarum pronoto et capiti a supero visis aequae longus, margine basali pronoti paullo longior.

22. **antennalis** n. sp.

45. (44). Minor. Articulus primus antennarum pronoto dimidioque capiti a supero visis aequae longus, margini basali pronoti longitudine aequelis.

23. **annulicornis** (REUT.)

46. (31). Articulus primus antennarum incrassatus, cylindricus, oculo a supero viso saltem aequae latus, dense et sat longe subadpressim molliter pilosus, ferrugineus, pallide flaviganti-conspersus. Corpus cum hemelytris dilute ferrugineum, his ferrugineo- et pallide flaviganti-conspurcatis. Membrana grisea, pallide conspersa. Vertex oculo $\frac{3}{4}$ — duplo latior, guttula basali media pallide flavicante. Femora ferruginea, pallide flaviganti-conspersa, postica sat longe ultra medium subparallelia. Tibiae et tarsi pallide flavigantes, solum apice tibiarum anteriorum basique posticarum infuscatis.

47. (48). Articulus primus antennarum pronoto capitique usque ad marginem anteriorem oculorum a supero visorum aequae longus; articuli reliqui omnes pallide flavigantes.

24. **pallidicornis** REUT.

48. (47). Articulus primus antennarum pronoto capitique toto a supero viso aequae vel fere aequae longus, reliqui pallidi, flavigantes, secundus circiter quarta apicali parte niger.

25. **lasiomerus** n. sp.

Phytocoris mundus UHL. (ined.?)

Oblongus, flavo-testaceus, unicolor, solam scutello hemelytrisque, limbo costali excepto, nonnihil rufescentibus, superne pallide-pubescent, ubique sat nitidus, membrana aequaliter grisecente, venis testaceis; rostro tertiam basalem partem ventris subsuperante, testaceo, apice