

capite nitido, unicolore, pronoto nitidulo, scutello hemielytris que opacis, corio maculis tribus opacis albidis signato, prima angustiore mox supra tertiam basalem partem, secunda rotundata vel oblonga fere in medio posita, tertia anguste triangulari, antice acuminata ad medium marginis apicalis, cuneo basi externe albedo; membrana nigricante, cum areolis albedo-irrorata, venis albidis vel dilute albedo-testaceis, cubitali nigricante, macula ad apicem cunei aliaque supra medium limbi exterioris albidis; in ferne obscure fuscus, medio albidus; rostro terebram feminae attingente, albedo, apicem versus fusco; antennis nigris, articulo primo lineari, pronoto ab antico viso longitudine subaequali, albedo-consperso, setis rigidis crassitie articuli aequae longis, articulo secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ — fere dimidio longiore, extrema basi albedo, annulo medio destituto, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo aequae longis, articulo quarto primo paullo et tertio circiter $\frac{1}{3}$ brevior; pedibus cum coxis albidis, femoribus anterioribus, saltem apicem versus, parcius, posticis totis nigricanti-conspersis, posticis (♀) altitudine fere sextuplo longioribus, margine antico pilis exsertis instructis, tibiis dense minute nigricanti-conspersis, annulis albidis destitutis, apice cum tarsis nigris, spinulis nigricantibus, tiliarum posticarum crassitie tibiae parum longioribus, tibiis posticis interne pallidis, muticis; capite a supero viso basi pronoti fere dimidio angustiore, pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevior, inter oculos angulato, vertice (♀) oculo aequae lato, oculis a supero visis orbicularibus; capite ab antico viso latitudini cum oculis aequae longo, a latere viso altitudini basali aequae longo, fronte versus apicem sat declivi, clypeo a basi fortiter prominente, angulo faciali subacuto, gula subhorizontali; pronoto latitudine basali vix magis quam $\frac{1}{3}$ brevior, lateribus late sinuatis, apice quam basi fere $\frac{3}{5}$ — fere dimidio angustiore; hemielytris (♀) abdomen modice superantibus, corio pronoto circiter duplo longiore; terebra feminae longa. Long. 7, lat. $2\frac{1}{3}$ mm.

Washington, d. 16 maji, 1902, 27 junii 1895, Retreat, NC, d. 1 junii, D. HEIDEMANN.

Species sat magna, capite unicolore, fusco-nitido, antennis articulis tribus ultimis nigris, corpore superne dense albo-farinoso-pubescente, hemielytris non nisi omnium brevissime nigro-pubescentibus, opacis, corio maculis tribus albidis notato, etiam his maculis omnibus opacis, apicali anguste triangulari, tibiis dense albo- et nigricanti-conspersis, annulis destitutis, posticis interne pallidis et muticis a reliquis optime distinguenda.

Phytocoris fumatus n. sp.

Oblongo-ovalis, superne obscure fumato-cinereus, totus opacus, breviter subadpressim nigro-pilosus, parcius maculatim albedo-tomentosus; punctis verticis, striis obliquis frontis lineolisque clypei et lorarum fusco ferrugineis; pronoto fascia tenui nigra ante marginem pallidum basalem fasciculas quatuor vel sex dense nigro-pilosas ferente; scutello apice paullo pallidior, ante apicem utrinque puncto nigro marginali; hemielytris vena clavi, margine costali venaque cubitali corii, nec non margine interiore cunei minute nigro-conspersis, corio apice macula nitida rhombea parum pallidior in angulum interiorem cunei extensa; membrana cum areolis dense hyalino-irrorata, macula ad apicem cunei hyalina, venis albidis vel pallide flaventibus, cubitali nigra; inferne nigro-fuscus, medio albidus; rostro medium ventris subsuperante, albedo, apicem versus fusco; antennis nigro-fuscis, articulo primo lineari, pronoto dimidioque caeteri aequae vel fere aequae longo, parce albo-adsperso, setis rigidis crassitie articuli paullo brevioribus, articulo secundo unicolori, primo vix $\frac{3}{4}$ et margine basali pronoti saltem dimidio longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo distincte longioribus, tertio primo aequae longo, quarto hoc circiter $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ brevior; pedibus cum coxis albidis, femoribus nigricanti-conspurcatis, dimidio apicali fusco nigris, albedo-conspersis, posticis altitudine maxima