

circiter sextuplo longioribus; tibiis aequaliter dense nigro-fusco-conspersis, nigricanti-spinulosis, spinulis tiliarum posticarum crassitie tibiae aequae longis, tarsis nigris; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevior, vertice (♀) oculo paullo latiore; capite ab antico viso latitudini cum oculis aequae longo, a latere viso altitudini basali longitudine subaequali, fronte apice sat declivi, clypeo sat fortiter prominente; oculis a supero visis orbicularibus; pronoto latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{4}$ brevior, lateribus late sinuatis, apice quam basi fere dimidio angustiore; hemielytris (♀) abdomine paullulum longioribus, corio pronoto circiter duplo longiore. ♀. Long. 7, lat. $2\frac{1}{4}$ mm.

Washington, d. 10—20 junii, D. HEIDEMANN.

Ph. fenestrato m. colore antennarum et pedum magnitudineque similis, corpore superne cum capite toto opaco, sed corio apice macula nitida rhombea instructo, pubescentia albida parum densa, vertice inter oculos paullo latiore, articulo primo antennarum longiore, etc. distinguendus; a *Ph. eximio* Reut. statura majore, colore structuraque antennarum, colore tiliarum anticarum, setis rigidis articuli primi antennarum spinulisque tiliarum paullo longioribus divergens.

Phytocoris subnitidulus n. sp.

Oblongus (♂) vel oblongo-ovalis (♀), superne obscure cinereus, leviter nitidulus, parce albedo-tomentosus, pilis nigris subdestitutus; capite obscure griseo, clypeo, loris, genis gulaque albidis; pronoto unicolori, limbo basali tenuissime pallido punctis quatuor vel sex dense nigropilosellis; scutello apice paullo pallidior, utrinque puncto minuto marginali nigro notato; hemielytris limbo costali nigricanti-variegato, corio macula apicali rhomboidali in basin cunei prolongata parum pallidior, sed paullo fortius nitida; membrana dense hyalino-irrorata, venis albidis, cubitali tota brachialique versus basin nigricantibus, limbo exteriori ante medium maculis duabus parvulis hyalinis; inferne nigro-fuscus, capite inferne, prostethio toto marginibus meso- et metastethii supra basin coxarum albidis, nec non disco ventris feminae albidis; rostro medium ventris subsuperante, albedo, apice nigro; antennis nigris, articulo primo lineari, pronoto parum longiore, parum alboguttato, setis crassitie articuli fere brevioribus, secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti saltem $\frac{3}{4}$ longiore, basi anguste annuloque obsoleto angusto infra medium albidis, parte basali albida crassitie articuli parum longiore, tertio primo paullulum vel parum longiore, basi albo, quarto tertio magis quam $\frac{1}{4}$ brevior; coxis basique femorum albidis, femoribus cetero nigro-fuscis, albo-adspersis, posticis latitudine basali circiter sextuplo longioribus, tibiis albidis, ubique dense nigro-fusco-conspersis, anterioribus ante apicem annulo albedo, spinulis tiliarum posticarum crassitie basali tibiae parum longioribus, tarsis nigricantibus; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, a supero viso pronoto circiter $\frac{1}{4}$ brevior, vertice oculo aequae lato (♂) vel hoc paullo latiore (♀); capite ab antico viso latitudine postica paullo longiore, a latere viso altitudini basali aequae longo, fronte subhorizontali solum apice fortius declivi, clypeo prominente, gula horizontali; oculis a supero visis orbicularibus (♂ ♀), maris quam feminae convexioribus; pronoto latitudine basali vix $\frac{1}{4}$ brevior, apice quam basi fere dimidio angustiore, lateribus late sinuatis, disco versus apicem sat declivi; hemielytris abdomen sat breviter superantibus (♂) vel ejus longitudine (♀), corio pronoto fere duplo et dimidio longiore; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico. ♂ ♀. Long. 8, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Washington, DC, d. 10 junii, D. HEIDEMANN; Plummers, Md, D. HEIDEMANN.

Ph. fumato n. sp. simillimus, differt autem articulo primo antennarum distincte brevior, capite apice sat late albo, nec non corpore superne nitidulo. An solum ejus varietas?