

Phytocoris heidemanni n. sp.

Oblongus, superne griseus, leviter nitidulus, albido-tomentosus, pilis nigris subdestitutus; capite striis frontis, vitta clypei striisque lorarum nigris; pronoto limbo basali tenuiter albido maculas sex dense nigro-pilosellas ferente; scutello utrinque ante apicem macula parva marginali nigra; hemelytris vena clavi, margine costali venaque brachiali corii nec non margine interiore cunei nigro-adspersis, corio macula apicali rhomboidali in cuneum continuata parum pallidiore et parum magis nitida, basi interne nigro-marginata; membrana cum areolis nigro- et cinereo-variegata, venis sordide griseo-flaventibus, vena cubitali nigra, limbo exteriore ante medium maculis duabus cinereis; inferne nigricans, disco ventris albido; rostro medium ventris subattingente, fusco, basin versus pallido; antennis nigris, articulo primo linearis, pronoto tertiaeque parti capitinis aequae longo, parce albo-adsperso, setis rigidis albis crassitie articuli aequae longis, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti saltem $\frac{2}{3}$ longiore, basi anguste albo, parte alba basali crassitie articuli vix longiore, articulo tertio primo parum longiore, quarto tertio paullo magis quam $\frac{1}{4}$ breviore; pedibus nigricantibus, coxis albidis, femoribus parce minute albo-adspersis, basi albidis, femoribus posticis altitudine maxima circiter quintuplo longioribus, ante apicem fascia obliqua alba notatis, tibiis annulis tribus angustis albis signatis, spinulis tibiarum albis, his tibiarum posticarum crassitie tibiae aequae longis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, a supero viso pronoto paullulum et latitudine sua postica parum breviore, vertice (φ) oculo duplo lato; capite ab antico viso latitudini posticae aequae longo, a latere viso altitudini basali aequae longo, clypeo usque a basi fortiter prominente, gula longa, horizontali; oculis a supero visis semi-orbicularibus; pronoto latitudine bassali circiter $\frac{2}{5}$ breviore, apice quam basi fere dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemelytris (φ) abdomen sat longe superantibus, corio pronoto duplo et dimidio longiore. φ . Long. 8, lat. $2\frac{2}{5}$ mm.

Pecos, N. M., d. 23 junii, D. HEIDEMANN.

Ph. fumato n. sp. sat similis, differt corpore superne cinereo, subnitidulo, pilis nigris subdestituto, articulo secundo antennarum multo longiore, vertice multo lato, pronoto fortius transverso lateribus rectis, tibiis aliter pictis, albo-spinulosis.

Phytocoris roseus (UHLER). — *Compsocerocoris* id. UHLER, Proc. Calif. Acad. Scienc. (2) IV, p. 253.

Von dieser schönen, durch den bleichen, wenig gezeichneten, gelblichen, etwas röthlich angehauchten Körper und die schwarzen, schneeweiss geringelten Fühler ausgezeichneten Art besitze ich ein Stück aus Pine Lake, Sv. Cal., von Mr JOHNSON gefunden und mir freundlichst von BAKER übersandt, ein zweites aus Los Angelos, Co., Ca., hat mir HEIDEMANN zur Ansicht gesandt. Der Kopf ist etwas mehr als $\frac{1}{3}$ schmäler als der Hinterrand des Vorderrückens, von der Seite gesehen eben so lang wie hinten hoch, der Kopfschild stark hervorragend, die Kehle in der Ebene des Peristomiums; der Scheitel wenig oder etwa $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ breiter als das rundliche, grünliche Auge. Fühlerglied 1 schlank, etwa so lang wie der Vorderrücken und der halbe Kopf von oben gesehen, Glied 2 etwa mehr als $\frac{2}{3}$ so lang wie 1 und fast anderthalb mal so lang wie der Hinterrand des Vorderrückens (σ), der weisse Basalring nur wenig schmäler als der Mittelring, die beiden letzten Glieder zusammen etwa so lang wie Glied 2, der Basalring des dritten Gliedes doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes. Pronotum kaum mehr als $\frac{1}{4}$ kürzer als am Hinterrande breit, die Seiten leicht geschweift. Die Halbdecken mehr oder weniger gleichförmig röthlich angehaucht, bedeutend länger als das Abdomen; die Membran glashell, grau gesprenkelt, die Hinterschenkel wohl sechsmal länger als am Grunde breit, gegen die