

nigricanti-marginatis, membrana cum venis sordide albida, parce variegata; inferne albicans, segmento maris genitali nigro-fusco; antennis articulo primo gracili, lineari, oculo a supero viso fere magis quam dimidio angustiore, pronoto et $\frac{2}{3}$ capitis a supero visis aequae longo, margini basali pronoti paullo longiore, albido, marginibus exteriori et interiori nigricantibus, setis rigidis albis crassitie articuli paullo longioribus, articulis reliquis nigricantibus, tenuibus, secundo primo paullo magis quam duplo longiore, basi albo, parte hac alba basali crassitie articuli fere duplo longiore, tertio basi anguste albo; pedibus albidis, femoribus parce nigricanti-conspurcatis, anterioribus externe linea percurrente nigricante notatis, posticis latitudine basali circiter sextuplo longioribus (σ), tibiis solum apice tarsisque nigricantibus, spinulis tibiatarum albis, crassitie tibiae aequae longis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, a supero viso pronoto saltem $\frac{1}{4}$ brevior et latitudini verticis oculique unici aequae longo, vertice oculo duplo latiore; capite ab antico viso latitudini posticae aequae longo, a latere viso leviter nutante, altitudini basali aequae longo, gula horizontali; oculis a supero visis margine interiore parallelis; pronoto latitudine basali fere $\frac{2}{5}$ brevior, apice quam basi paullo minus quam dimidio angustiore, lateribus subsinuatis, disco versus apicem leviter declivi; hemielytris abdomen paullo superantibus; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturam mutico. σ . Long. $5\frac{1}{2}$, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Rifle, Oil., d. 25 julii 1900, commun. D. VAN DUZEE.

Ph. canescens n. sp. et *valido* (UHL.) n. sp. affinis, ab illo vertice latiore, oculis minoribus et minus convexis, a supero visis haud orbicularibus, articulo primo antennarum nigricanti-lineato nec consperso, pronoto longiore, linea longitudinali capitis pronoti, et scutelli alba distinctissima tibiisque anterioribus annulis nigricantibus destitutis, ab hoc vertice latiore, oculis minoribus, antennis multo tenuioribus, aliter coloratis articuloque earum primo longiore et multo graciliore, setis rigidis exsertis instructo, hemielytris brevioribus mox distinguendus.

Phytocoris validus (UHLER).

Elongatus (σ) vel elongato-ovatus (φ), albido canus, opacus, linea tenui longitudinali mediana per caput, pronotum et scutellum ducta albida, utrinque griseo-marginata, pronoto adhuc punctis duobus vel quatuor stricturae apicalis vittisque utrinque duabus a callis ad basin ductis obliquis (σ) vel parallelis (φ) cinerascentibus; hemielytris venis dilutioribus, saepe praecipue feminae magis minusve griseo- vel nigricanti-marginatis; hemielytris maris abdomen sat longe superantibus, membrana sordide albida venis concoloribus, feminae abbreviatis, vix magis quam $\frac{2}{3}$ basales dorsi abdominis tegentibus, coriaceis, apice rotundatis, cuneo membranaque haud discretis; capite basi pronoti saltem $\frac{2}{5}$ (σ) vel paullulum (φ) angustiore, a supero viso pronoto circiter $\frac{1}{4}$ brevior (σ) vel huic aequae longo (φ) et latitudine sua postica paullo brevior, vertice oculo fere $\frac{3}{4}$ (σ) vel fere duplo (φ) latiore; capite ab antico viso aequae longo ac lato, a latere viso altitudini aequae longo, fronte subhorizontali, solum apice subito declivi, clypeo a basi prominente, gula horizontali; rostro apicem coxarum posticarum paullo superante, apice nigro; antennis articulo primo griseo, minute albo-consperso, maris anguste cylindrico, basi constricto, oculo a supero viso feri $\frac{1}{4}$ angustiore, pronoto parum longiore, feminae crassius cylindrico, ante basin constrictam nonnihil crassiore, oculo aequae lato, pronoto capitique usque ad marginem anticum oculorum aequae longo, articulis reliquis pallide stramineis, secundo primo fere duplo (φ) vel duplo (σ) longiore et margine basali pronoti duplo (φ) vel fere $\frac{3}{4}$ (σ) longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo vix aequae longis (σ); pronoto latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevior (σ) vel huic aequae longo (φ brachypt.), apice quam basi dimidio (σ) vel $\frac{1}{4}$ (φ) angustiore, lateribus leviter sinuatis (σ) vel subrectis (φ), disco versus apicem sat declivi (σ) vel horizontali (φ brachypt.); femoribus