

horizontal; der Scheitel des Weibchens kaum doppelt so breit wie das Auge. Die Augen graugrünlich. Der Schnabel reicht ein wenig über die Hinterhüften heraus. Das erste Fühlerglied ist etwas breiter als das Auge, so lang wie das Pronotum und der Kopf von oben gesehen bis an den Vorderrand der Augen, dicht anliegend schwärzlich behaart, rostbraun und bleichgelb gesprenkelt, mit wenigen stärker hervorragenden Haaren, das Glied 2 ist wie die Apikalglieder ganz einfarbig hellgelblich, fast doppelt so lang wie Glied 1, Glied 3 etwa $\frac{2}{5}$ länger und 4 kaum kürzer als 1. Das Pronotum etwa $\frac{2}{5}$ so kurz wie hinten breit, an der Spitze halb so schmal wie hinten breit, die Seiten breit geschweift, die Scheibe gegen die Spitze leicht abschüssig; die Apikalstruktur trägt in der Mitte einen gelben Punkt. Die Halbdecken sind rostbräunlich und gelblich gesprenkelt, der Cuneus mit dunkelbrauner Spitze, die Membran graulich und glashell gesprenkelt mit gelblichen Nerven. Die Schenkel dicht hellgelb und rostbraun gesprenkelt, die Hinterschenkel etwas mehr als sechsmal so lang wie breit; die Schienen und Füsse schalgelb, Vorder- und Mittelschienen nur an der Spitze, Hinterschienen am Grunde gebräunt, die Stacheln länger als die Dicke der Schienen, bräunlich. — Der Kopf des Typusexemplars ist sicher nur ganz zufällig etwas aus dem Pronotum hervorgeschoßen.

Von dieser Art habe ich bisher nur das Typusexemplar aus Wisconsin (Mus. Stockholm) gesehen.

Phytocoris lasiomerus n. sp.

Subelongatus, dilute ferrugineus, nitidulus, hemielytris minus dense sed sat fortiter flavicanti pubescentibus; antennis articulo primo longo et crasso, cylindrico, oculo a supero viso saltem aequo lato vel (φ) paullo latiore, capiti et pronoto a supero visis longitudine aequali vel subaequali, dense sat longe subadpressim molliter nigricanti-piloso, setis rigidis destituto, ferrugineo, pallide testaceo-conperso, articulis reliquis pallide flaventibus, secundo primo duplo longiore, circiter quarto apicali parte nigro, vertice guttula media basali pallide flavente; pronoto guttula media stricturae apicalis margineque basali tenuiter pallide flaventibus, raro lateribus vittaque media infuscatis; scutello apice flavescente; hemielytris dense ferrugineo- et pallide flavente-conspurcatis, cuneo pallido, apice obscure fusco; membrana grisea, pallide conpersa, limbo exteriore maculis duabus majoribus pallidis ante medium, venis testaceis; femoribus dense ferrugineo- et pallide-flaventi conspersis, posticis crassitie fere septuplo longioribus, sat longe ultra medium subparallelis, dein sensim attinuatis; tibiis tarsisque pallide flavo testaceis, tibiis anterioribus apice, posticis basi infuscatis, spinulis tenuibus, crassitiei tibiarum aequo longis; capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, a supero viso pronoto circiter $\frac{1}{4}$ breviore, vertice oculo $\frac{3}{4}$ (σ) vel duplo (φ) latiore; capite ab antico viso latitudini posticæ aequo longo, a latere viso altitudini basali fere nonnihil longiore, fronte versus apicem leviter declivi, clypeo usque a basi fortiter prominente, gula horizontali; pronoto latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{4}$ breviore, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus late sinuatis, disco versus apicem sat leviter declivi; hemielytris abdomen modice longe superantibus. ♂ ♀. Long. $7\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Gold River, Long Lake, Huckleberry, D. Dr HORWATH (Mus. Hungar.).

Ph. pallidicorni REUT. simillimus et valde affinis, forsitan solum ejus varietas, tamen articulo primo antennarum distinete longiore articuloque secundo apice sat late nigro nec toto pallide flavente differre videtur.