

Eustictus nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, nitidum, subglabrum, pube facilliter divellenda aurea vel argentea destitutum; capite verticali, basi pronoti dimidio angustiore, a supero viso pronoto fere dimidio brevior, transverso, vertice immarginato, sulco longitudinali bene impresso, maris angusto; capite ab antico viso transverso (♂) vel latitudini posticae fere aequae longo (♀), a latere viso altitudine basali sat multo brevior, fronte perpendiculari, transversim impresso-strigata, clypeo perpendiculari, leviter prominente, a fronte linea impressa distincte discreto, loris haud buccatis, angulo faciali recto, genis linearibus (♀) vel haud distinguendis (♂), gula brevi; oculis magnis, sed parum exsertis, in genas longissime extensis (♀) vel genas totas occupantibus, granulatis, orbita interiore fortiter sinuatis; rostro apicem coxarum posticarum superante, articulo primo apicem xyphi prosterni attingente; antennis longis, fere ad medium marginis interioris oculorum insertis, articulo primo elongato-obconico, secundo versus apicem sensim sat leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, tertio apici secundi aequae crasso, quarto tertio nonnihil crassiore et hoc brevior; pronoto transverso, trapeziformi, apice quam basi fere $\frac{2}{3}$ angustiore, strictura apicali tenui, basi articuli secundi antennarum tenuiore, lateribus rectis, margine basali latissime rotundato, medio recto, disco versus callos convexo-declivi, distincte impresso-punctato, callis fere $\frac{2}{5}$ apicales occupantibus, subcoriaceis, optime discretis sed sat deplanatis, magnis, subovalibus, obliquis, interne anguste distantibus, area antica inter callos triangulari laevi, pone stricturam apicalem distincte reflexo-marginata; scutello basi detecto, parte apicali horizontali, deplanata; corio venis solum duabus distinguendis, cuneo latitudine basali longiore, leviter declivi, membrana angulo interiore apicali areolae majoris obtuse angulato-rotundato; xypho prosterni marginato; mesosterno sat brevi; metastethio orificiis rimam obliquam oclusam formantibus; coxis anticis medium mesosterni superantibus; pedibus longis, femoribus linearibus, posticis apicem abdominis subattingentibus (♀) vel paullo superantibus (♂), tibiis tenuiter spinulosis, tarsis articulo primo reliquis multo (vix tamen duplo) crassiore et his simul sumtis aequalongis inferne dense pubescente, secundo brevi; segmento maris genitali ad sinum sinistrum mutico; terebra feminae longa.

Primo intuitu generi *Megacoelum* FIEB. simillimus et huic structura capitis antennisque apicem versus haud gracilioribus affinis, articulis autem harum duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, structura valde divergente pronoti et praecipue tarsorum, nec non segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturam mutico certe distinctus.

Typus: *Megacoelum grossum* UHL.

Obs. Diese Gattung weicht von den am nächsten verwandten durch das deutlich eingestochene punktierte Pronotum ab und scheint infolgedessen in eine ganz verschiedene Gruppe (die mit *Capsus*, *Deraeocoris*, *Lygus* u. a. verwandte) gebracht werden zu müssen; doch weisen nicht nur der ganze Habitus, sondern auch die ganz glatten (unpunktierten) Halbdecken ihr ihren richtigen Platz in der Nähe des *Megacoelum* FIEB. an, an welche die Struktur des Kopfes und der Fühler stark erinnert.

Eustictus grossus (UHL.). — *Megacoelum* id. UHL., Ent. Amer. III, 1887, p. 70.

Diese Art, von welcher Herr HEIDEMANN ein ♂ und ein ♀ aus Washington D. C. (d. 12 sept. gefangen) mir zugesandt hat, ist fast einfarbig holzbraun, die Fühler und die zwei letzten Fussglieder schalgelb, das vierte Fühlerglied schwarz. Der Scheitel des Männchens fast mehr als halb so schmal wie das Auge, derjenige des Weibchens ein wenig breiter als das Auge. Das erste Fühlerglied ein wenig länger als der Kopf von vorne gesehen, das zweite $\frac{1}{3}$ —