

culo secundo margini basali pronoti aequo longo, (♀) vel hoc paullulum longiore (♂), tertio secundo parum breviore et quarto duplo longiore; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ breviore, lateribus late sinuatis, callis parum convexis, medio disjunctis, medium longitudinis pronoti attingentibus, maris interdum infuscatis, disco postico laevi. ♂ ♀. Long. $4\frac{1}{3}$ — $4\frac{3}{5}$, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Variat fronte medio infuscata.

Secundum UHLER l. c. a Colombia usque in Mexico, Texas et Florida distributa. Etiam in Antillis. Specimina e Texas (D. BELFRAGE, Mus. Holm., spec. typica), e Mexico (Acapulco, D. BAKER) et Nicaragua (San Marcos, Managua, D. BAKER) examinavi.

A sequentibus statura majore, antennis longioribus et aliter coloratis, oculis majoribus, vertice inter eos angusto, colore hemelytrorum basique tibiarum nigra divergens.

Cyrtopeltis simplex n. sp.

Pallide sordide griseo-virescens, pallido-pubescent, unicolor, solum fronte medio fuscenscente (♂) vel clypeo, fronte medioque verticis nigris nitidis, vertice utrinque macula magna ad oculum retrorsum dilatata pallida (♂); rostro, antennis pedibusque concoloribus, antennarum articulo primo annulo subbasali saepe secundo basi et apice fuscenscentibus, extremo apice tarsorum cum unguiculis nigro; hemelytris innotatis, unicoloribus, membrana griseescenscente, venis pallide griseo-virescentibus; capite basi pronoti paullo magis quam $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice planiusculo, oculo duplo latiore, pone oculos breviter constricto, lateribus retrorsum levissime convergentibus, margine basali medio carinato antice striga impressa terminato; oculis nigris, mediocribus; rostro apicem coxarum intermedianarum attingente; antennis articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ breviore, tertio secundo parum breviore, leviter curvato, quarto tertio vix dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ breviore, lateribus levissime sinuatis, callis medium disci attingentibus, parum convexis, disco postico tenuiter transversim strigoso. ♂ ♀. Long. $3\frac{2}{3}$, lat. $\frac{4}{5}$ —1 mm.

Mtes prope Claremont, Cal., D. BAKER.

C. variante (DIST.) minor, oculis minoribus, vertice inter eos multo latiore, margine ejus postico medio subcarinato, antennis brevioribus et aliter coloratis, cuneo apice geniculisque concoloribus pallidis certe distinctus.

Cyrtopeltis melanocephalus n. sp.

Pallide livido-testaceus, superne subtiliter pallido-pubescent, capite nigro; callis pronoti maculaque media basali cunei oblonga vel rotundata in corium nonnihil producta piceonigris, cuneo cetero pallido, apice concolore; membrana pellucida; antennis articulo primo albido-flavente, ante medium nigro-annulato, articulis reliquis nigro-fuscis, secundo saepe apicem versus pallescente; rostro pedibusque totis pallide lividis, geniculis concoloribus, tarsis extremitate apice fuscenscente; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice convexiusculo, nitido, oculo magis quam duplo latiore, pone oculos brevissime constricto, lateribus parallelo; oculis mediocribus; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo secundo margini basali pronoti aequo longo vel hoc paullo breviore, tertio secundo parum vel paullo breviore, curvato, quarto tertio dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ breviore, lateribus basin versus late sinuatis, callis medio disjunctis, sat convexis, subquadratis, medium longitudinis pronoti attingentibus. ♂ ♀. Long. $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{2}{5}$, lat. $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ mm.

Tourney, Tex. (Martinya Comissiona) d. 27 julii 1899, communicavit D. HEIDEMANN.