

14. *D. purgatus* STÅL.

Subelongatus, dilute subsordide flavescens, scutello obscuriore; thorace posterius intra marginem linea transversa nigro-fusca; membrana rufescente-venosa; antennis longis, articulo basali subsanguineo-irrorato, 2 et 3 apicem versus dilute sanguineis, 4 apicem versus fusco-subsanguineo. Long. 7, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).

Antennæ corpore multo longiores, articulo basali thorace paullulum longiore, reliquis illo nonnihil gracilioribus, inter se subæquicrassis, 2 basali fere duplo longiore, 3 secundo nonnihil brevior, 4 basali fere æquilongo, secundo vix vel parum graciliore.

15. *D. sticticollis* STÅL.

Oblongus, dilute testaceo-flavescens, opacus, subsericeus, supra fusco-irroratus; oculis magnis; thorace scutelloque profunde punctatis; membrana fusca, maculis parvis decoloribus irrorata. Long. 6½, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm.).

Caput latitudine ½ brevior, oculis maximis, supra valde approximatis, subtus fere coëuntibus. Antennæ articulo basali capite nonnihil brevior, 2 illo duplo longiore, apicem versus nonnihil incrassato, 3 basali nonnihil longiore, ultra medium albedo, apice fusco, 4 basali æquilongo, basi apiceque fusco. Thorax antierius callis 2 nitidis, nigricantibus. Scutellum admodum convexum. Hemelytra dense confluentur fusco-adspersa. Pedes fusco-annulati et-adspersi.

16. *D. sticticus* STÅL.

Oblongus, profunde punctatus, nitidulus, varicolor; antennis flavo-testaceis, articulo 2 apicem versus nigro-fusco, 3 apice fusco; scutello convexiusculo; membrana fuscescente, venis, macula utrinque basali ad marginem appendicis aliaque interiore decoloribus, hyalinis. ♀. Long. 5, Lat. 2 Millim. — (Mus. Holm.).

var. *a.* — Nigricans, capite testaceo; thoracis margine postico tenuiter maculaque minuta triangulari media basali, macula utrinque basali apiceque scutelli obsoletis, tibiis apicem versus tarsisque flavo-testaceis, appendicis apice testaceo-flavo.

var. *b.* — Flavo-testaceus, subtus obscurior; thorace antierius, parte dimidia posteriore hemelytrorum pedibusque nigro-fuscis aut obscure fusco-testaceis, femorum apicibus, tibiis apicem versus tarsisque flavo-testaceis; appendicis apice testaceo-flavo.

Antennæ corpori fere æquilongæ, articulo basali capitis latitudine intraoculari paullulum vel vix longiore, 2 illo fere ter longiore, apicem versus nonnihil incrassato, 3 basali nonnihil longiore.

17. *D. cribrosus* STÅL.

Ovalis, parum nitidus, puberulus, testaceus, subtus cum disco posteriore corii appendiceque obscurior, supra totus dense valde distincte punctatus; pedibus, antennis abdomineque valde obscure fusco-testaceis; vittis 2 thoracis, scutelli disco nigricantibus; membrana fuscescente; antennis compressis. ♀. Long. 3½, Lat. 1½ Millim. — (Mus. Holm.).

Antennæ corpore ½ fere breviores, articulo basali brevissimo, capitis latitudine intraoculari fere dimidio brevior, 2 illo quater longiore, compresso, lato, 3 et 4 gracilibus, singulo basali fere æquilongo.

18. *D. lenticulosus* STÅL.

Oblongus, pallide testaceo-flavescens, opacus, parce pilosus; antennis nonnihil obscurioribus, articulo 2 apicem versus nigro-fusco, 3 pallido; oculis majusculis, globosis; hemelytris irregulariter fusco-reticulatis vel fuscis, subconfluentur dense testaceo-flavo-irroratis; tibiis pallide fuscis, annulo medio lato pallide testaceo-flavo. ♀. Long. 6¾, Lat. 2¾ Millim. — (Mus. Holm.).

Caput latitudini æquilongam, inter oculos longitudine plus dimidio angustius, oculis magnis. Antennæ corpore paullulum breviores, subgraciles, articulo 1 capiti vix æquilongo, 2 illo vix duplo longiore, cum basali