

melytris albido-vitreis, basi clavi, fascia mox pone medium corii, margine angusto basali appendicis, articuloque secundo antennarum incrassato (basi excepta) nigro-fuscis; membrana macula pallide fuscescente; abdomine pedibusque posticis dilute lutescentibus, tibiis posticis ultra medium fuscis. ♂. ♀. Long. 5, Lat. $2\frac{1}{2}$ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

25. *D. clarus* STÅL.

Anguste oblongus, nigricans, nitidus, thorace sat profunde punctato; antennarum articulis 2 apicalibus, capite, annulo calloso apicali margineque ipso basali thoracis, pedibus abdomineque flavo-albidis; hemelytris vitreis, clavo (macula media ad suturam clavi excepta), margine corii apicali medio interrupto venisque membranæ nigro-fuscis; thorace medio maculis 2 obsoletis flavo-testaceis. ♂. Long. $4\frac{1}{4}$, Lat. $1\frac{3}{8}$ Millim. — (Mus. Holm.).

Articulus basalis antennarum capitis latitudine intraoculari nonnihil longior, 2 illo plus duplo longior, æquicrassus.

26. *D. insignis* STÅL.

Anguste oblongus, dilute sordide albido-flavescens, subtus cum pedibus flavo-albidus; antennarum articulo basali toto, 2 apice fuscis; hemelytris decoloribus, hyalinis, corii margine interno et apicali (medio fere interrupto) maculaque media transversa ad angulum apicalem clavi clavoque (macula media excepta) obscure fuscis; thoracis profunde punctati macula posteriore utrimque scutelloque nigricantibus. ♀. Long. $4\frac{1}{4}$, Lat. $1\frac{3}{8}$ Millim. — (Mus. Holm.).

Articulus basalis antennarum thorace $\frac{1}{2}$ brevior, 2 illo gracilior, haud duplo longior.

Henicocnemis STÅL. Nov. gen.

Corpus oblongum. Antennæ articulo basali thorace brevior. Thorax antice callosannulatus. Membrana bicellulata. Femora postica compressa, latiuscula. Tibiæ anticæ compressæ, valde dilatatae, posticæ spinulosæ. Tarsi paralleli.

Genus *Deræocoridi* proximum, structura tiliarum anticarum ab omnibus hujus familiæ adhuc cognitæ mox distinctum.

1. *H. patellata* STÅL.

Varicolor, nitida; capite nigricante, utrimque ad oculos lineola flavicante; membrana fusca, venis apice albidis; antennis obscure fusco-testaceis vel nigro-fuscis, basin versus dilutionibus, basi ipsa articularum 2 et 3, annulo medio tiliarum mediarum, annulis 2 posticarum, tarsisque (apice excepto) albidis. ♀. Long. $5\frac{3}{8}$, Lat. $2\frac{1}{4}$ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

var. *a.* — Nigricans.

var. *b.* — Nigricans aut nigro-fusca, pedibus obscure testaceis.

var. *c.* — Ut var. *b.*, sed femoribus flavo-testaceis.

var. *d.* — Nigricans, vel nigro-fusca, disco thoracis, scutello, corio appendiceque sordide rufescente-testaceis.

var. *e.* — Thorace femoribusque, illo dilute, his obscure rufescente-testaceis, tibiis hemelytrisque fuscescentetestaceis.

Cyllecoris HAHN; KIRSCHB.

1. *C. gracilentus* STÅL.

Elongatus, nigricans, subopacus; antennis longis, nigro-fuscis, articulo 3 basi albido, basali cum pedibus flavo-testaceo, femoribus posticis apicem versus, coxis hemelytrisque