

1. *H. armatus* STÅL.

Nigro-fuscus, opacus, parce flavo-testaceo-pilosulus, femoribus, clavo, corio medio apiceque abdominis testaceis; corii fascia angusta media albida. ♀. Long. 9, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Articulus basalis antennarum capititis latitudine intraoculari nonnihil brevior, 2 illo ter longior, apicem versus incrassatus, subcompressus, utrimque sulcatus; articulis 1 et 3 basi ipsa testaceo-flavis.

**Valdasus** STÅL. Nov. gen.

Corpus oblongum, supra planiusculum, puberulum. Caput parvum, supra visum brevissimum, fronte perpendiculariter decliva, obtriangulari, vertice inter oculos inciso. Oculi globosi, subpyriformes, sursum prominentes. Thorax transversus, longitudine plus duplo, et postice quam antice fere plus ter latior, lateribus rectis, ante scutellum magnum latissime leviter sinuatus. Hemelytra subparallelia; membrana bicellulata. Tarsi longiusculi, graciles, articulo basali apicalibus 2 æquilongo, crassiore. Antennæ gracillimæ, setaceæ, corpore dimidio fere longiores, articulo basali crassiusculo, capitatis latitudini fere æquilongo.

Genus habitu sat singulari, forma capitatis, tarsis longis et gracibus eorumque structura valde insigne.

1. *V. Schönherrii* STÅL.

Nigricans, opacus, puberulus, basi articuli 3 antennarum albida; angulo externo apicali corii et basi appendicis lutescentibus, membrana fusca, ad marginem apicalem appendicis anguste pallidiore. ♀. Long. 8, Lat. 3 Millim. — (Mus. Holm.).

**Sinervus** STÅL. Nov. gen.

Corpus elongatum, parallelum. Caput supra visum breve, fronte reclinato-decliva, obtriangulari, angulis basalibus sursum subcylindrico-productis; oculis globosis. Antennæ setaceæ, articulo basali reliquis crassiore, capitatis latitudini fere æquilongo. Thorax antrorsum angustatus, latitudine nonnihil longior, medio constrictus. Hemelytra parallela, appendice retrorsum angustissime et longissime producta, membranam unicellulatam per totam fere longitudinem extus terminante. Pedes longi, valde graciles; tarsis apicem versū sensim nonnihil latiores.

Genus distinctissimum, capitatis forma singulari (capitatis *Labopis* haud dissimili), structura hemelytrorum tar- sorumque valde insigne.

1. *S. Bärensprungi* STÅL.

Niger, nitidus, punctulatus; antennis (articulo basali excepto), femoribus basin versus, tibiis, tarsis hemelytrisque albidis, horum basi ipsa, commisura, fascia media corii, appendice venaque membranæ obscure fuscis. ♂. Long. 4, Lat. ¾ Millim. — (Mus. Holm.).

**Monalonion** H. SCH.1. *M. Schaefferi* STÅL.

Elongatum, obscure flavo- vel rufescente-testaceum, nitidum, capite thoraceque antico nigris; appendice fusco-sanguinea; membrana fusca; pedibus pallide flavo-testaceis. ♂. ♀. Long. 9, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL.).

Variat