

Variat antennis nigris, articulo basali flavo-testaceo, vel obscure testaceo, articulo basali nigro. Forte varietas *M. parviventris* (*H. Sch.*), aliter colorata, et (sec. dimensiones ab auctore indicatas) minor videtur.

### **Eccritotarsus** STÅL. Nov. gen.

Corpus forma variabile, ovale, oblongum, vel elongatum. Membrana unicellulata. Tarsi basi gracillimi, apicem versus sensim latiores, crassiores.

Genus structura tarsorum a ceteris sue familiæ mox distinctum, species pulcherrimas continens.

#### A. Caput ante oculos plus minus declivum.

##### 1. *E. semiluteus* STÅL.

Oblongus, lutescens, subsericeus, nitidulus, punctulatus, antennis, apice scutelli, hemelytris (regione subbasali excepta), femoribus apicem versus, abdomine (basi excepta), tibiis tarsisque nigricantibus; membranæ parte dimidia basali nigro-fusca, apicali decolori. Long. 8, Lat. 3½ Millim. — (Mus. Holm.).

##### 2. *E. pallidipes* STÅL.

Subelongato-ovalis, nigricans, punctulatus, subsericeus, thorace et basi ipsa hemelytrorum flavo-rufescens; pedibus flavo-albidis, tibiis apicem versus tarsisque nigro-fuscis; membrana apice albido-marginata. ♂. Long. 7, Lat. vix 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL).

##### 3. *E. dimidiatus* STÅL.

Elongato-ovalis, nitidus, punctulatus, subsericeus, nigricans; capite thoraceque rufotestaceis, illius lobo medio apice nigro; coxis apice, trochanteribus omnibus, femoribusque posticis basi flavo-albidis; membrana fusca. ♀. Long. 5, Lat. 1½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL).

##### 4. *E. lutescens* STÅL.

Oblongus, pallide flavescens vel rufo-lutescens, nitidus, obsolete punctulatus, subsericeus; antennarum articulo 1 (basi excepta) et 2 nigro-fuscis; membrana decolore, flavo-vel luteo-venosa. ♂. ♀. Long. 5½, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL).

##### 5. *E. nigro-plagiatus* STÅL.

Oblongus, dilute lutescens, nitidus; antennarum articulis 1 et 2 (illius basi ipsa excepta), scutello pone medium, clavo (parte basali excepta), parte dimidia interna corii appendicisque, femoribus apice tibiisque nigricantibus; angulo basali membranæ fusco. ♀. Long. 5½, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm.).

##### 6. *E. discifer* STÅL.

Oblongus, dilute cinnabarinus, subopacus, subsericeus, dense subtiliter punctulatus; antennarum articulis 2 apicalibus flavo-albidis, articulo secundo, scutello, clavo, macula magna corii ad commisuram nigricantibus; membranæ basi fusca; pedibus luteo-albidis. ♀. Long. 5, Lat. 2½ Millim. — (Mus. Holm. et STÅL).

##### 7. *E. nigro-cruciatus* STÅL.

Oblongus, nigricans, subopacus, dense subtiliter punctulatus; parte dimidia basali corii, appendice pedibusque subsordide flavo-albidis; femoribus apice tibiis apicem versus fuscis. ♀. Long. 4, Lat. vix 2 Millim. — (Mus. Holm. et STÅL).