

ATTILIO CARAPEZZA

LIVIOPSALLUS NOV. GEN. TAMANINII NOV. SP., NUOVO MIRIDE
SICILIANO DEL GRUPPO CEPHALOCAPSUS
(Heteroptera Miridae)

All'inizio dell'estate del 1979 ha raccolto in due località dell'interno della provincia di Palermo alcuni esemplari di una specie di Miridae che, ad un attento esame, sono risultati appartenenti ad una nuova entità di un nuovo genere del gruppo *Cephalocapsus* che propongo di chiamare *Liviopsallus* nov. gen. *tamaninii* nov. sp.

Liviopsallus nov. gen.

Il gruppo *Cephalocapsus* fa parte della sottofamiglia *Phylinae*, nell'ambito della quale si distingue facilmente per la presenza di due evidenti arolii che si originano nella zona dell'empodio compresa tra l'attaccatura delle unghie (fig. 10); in tutti gli altri generi dei *Phylinae* al posto degli arolii si trovano invece due setole. Del gruppo *Cephalocapsus* erano noti quattro generi: *Cephalocapsus* Popp. diffuso nella regione etiopica, *Paramixia* Reut. comprendente due specie e presente nella regione etiopica, e nel Mediterraneo orientale (Egitto ed Israele), *Chinacapsus* Wagn. endemico dell'isola di Madera e ricco di undici specie, *Lindbergopsallus* Wagn. comprendente cinque specie e presente soltanto in alcune isole dell'arcipelago delle Canarie (fig. 1).




Fig. 1 - Distribuzione paleartica dei generi del gruppo *Cephalocapsus*: (1) *Lindbergopsallus* Wagn.; (2) *Chinacapsus* Wagn.; (3) *Paramixia* Reut.; (4) *Liviopsallus* nov. gen.