

tamanho pequeno, pontuado, revestido de pubescência longa e erecta.

Cabeça transversal, cerca de sete vezes mais larga que longa, vértice finamente marginado, formando juntamente com a margem posterior dos olhos uma curva em semicírculo voltada para trás (Fig. 7), fronte fortemente arredondada em frente aos olhos, clipeo, jugo e loro obsoletos, gula, gena e búcua muito pequenos, epifaringe alcançando o terço apical da primeira coxa (Fig. 8), rostro curto, atingindo as coxas medianas; olhos salientes, semipedunculados, voltados para trás, contíguos ao pronoto; antena de comprimento médio, segmento II apenas duas vezes mais longo que o I, segmento III e IV muito finos, pêlos mais longos que a grossura dos segmentos.

Pronoto com collar deprimido, calos confluentes, pouco definidos, disco pontuado, margem laterais arredondadas, margens posterior reta, ângulos umerais redondos; mesoescuto descoberto, escutelo plano.

Hemiélitro pontuado, embólio alargado, cúneo mais longo que largo na base, membrana biareolada.

Pernas de comprimento médio, unhas e parempódio do tipo Orthotylini.

Espécie tipo do gênero: *Caruarina rubronotata* n.sp.

Difere dos demais gêneros da tribo pela conformação peculiar da cabeça na parte anterior aos olhos.

O nome genérico é alusivo à cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, onde existe uma bela floresta protetora do manancial da água para abastecer a população.

Caruarina rubronotata n.sp.

(Figs. 6-11)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,4 mm, largura 1,0 mm. *Cabeça*: comprimento 0,1 mm, largura 0,72 mm, vértice 0,30 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,6 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,2 mm. *Pronoto*: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,8 mm. *Cúneo*: comprimento 0,40 mm, largura na base 0,20 mm (holótipo).

Coloração geral castanho-avermelhada; cabeça, pronoto, escutelo e cúneo vermelhos, hemi-

litros castanho-avermelhados mais escuros na parte apical do clavo (tendendo a fusco), membrana escura, rostro, epifaringe e pernas castanho-claros, lado inferior avermelhado.

Genitália: pênis (Fig. 9) simples, vésica membranosa. Parâmero esquerdo (Fig. 10) alongado, afilado para a extremidade, com pequena saliência mediana. Parâmero direito (Fig. 11) simples, com dilatação sub-basal.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Caruaru, Pernambuco, BRASIL, IV.1972, M. Alvarenga col., na coleção do autor. *Parátipos*: dois machos, mesmas indicações que o tipo.

O nome específico é alusivo à coloração avermelhada do corpo, especialmente da cabeça, pronoto, escutelo e cúneo.

Ceratocapsus peruanus n.sp.

(Figs. 12-15)

Caracterizada pela coloração preta e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,6 mm, largura 1,3 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,30 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,16 mm; II, 0,6 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,2 mm. *Pronoto*: comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. *Cúneo*: comprimento 0,30 mm, largura na base 0,30 mm (holótipo).

Coloração geral preta, brilhante; membrana fusca; segmentos I e II da antena castanho-claros, o segundo mais claro; rostro e trocanteres pálidos.

Corpo fortemente pontuado, rostro alcançando as coxas II, pronoto visivelmente estreitado para a cabeça, pubescência com pêlos longos, erectos e pêlos semiadpressos, membrana finamente pilosa.

Genitália: pênis (Fig. 13) com extremidade apical característica. Parâmero esquerdo (Fig. 14) bifurcado, um dos ramos bipartido na região sub-apical e o outro fortemente curvo no ápice. Parâmero direito (Fig. 15) alargado para a extremidade apical, dividido em dois lobos.

Fêmea: semelhante ao macho em coloração e dimensões.

Holótipo: macho, PERU, Monson Valley, Tingo Maria, IX.23.1954, E. I. Schlinger & E. S. Ross col., na coleção da Academia de Ciências da Califórnia (CAS), São Francisco. *Parátipos*: 3 machos e 6 fêmeas, mesmas indicações que o tipo, na coleção acima e do autor.