

base 0,7 mm. *Cúneo*: comprimento 0,40 mm, largura na base 0,20 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas pretas, brilhantes; cabeça, pronoto, escutelo, terço apical do clavo, faixa na comissura e ao longo do ápice do cório, alcançando o embólio e prolongando-se ao longo da margem interna do cúneo até o ápice, preta; olhos castanhos, antena pálido-amarelada, porção apical do segmento I, extrema base e terço apical do segmento II pretos.




Fig. 31 – *Hyalochloria aliformis* n.sp.: macho, holótipo.

Lado inferior pálido-amarelado, xifo do prosterno e lados da propleura superiormente pretos.

Corpo liso, pilosidade erecta, margem posterior do pronoto convexa, escutelo fortemente entumecido (tuberculiforme) na região mediana, visivelmente mais alto que a superfície do clavo, olhos muito grandes, ocupando toda a margem lateral da cabeça, segmento I da antena cilíndrico, mais engrossado subbasalmente, segmento II curvo no terço basal, com duas cerdas negras erectas e pêlos claros muito curtos, olhos pilosos entre as facetas.

*Genitália*: não dissecada por tratar-se de exemplar frágil e único.

*Fêmea*: desconhecida.

*Holótipo*: macho, Ouro Preto, Rondônia,

XI.1983, Olmiro Roppa col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro (MN).

Aproxima-se muito de *Hyalochloria arari-pensis* n.sp. diferindo desta pelo tubérculo do escutelo, morfologia do segmento II da antena e forma da mancha preta do cório e cúneo.

O nome específico é alusivo à mancha negra do hemiélitro.

*Hyalochloria antilleana* n.sp.

(Fig. 32)




Fig. 32 – *Hyalochloria antilleana* n.sp.: fêmea, holótipo.

Caracterizada pela coloração do hemiélitro.

*Fêmea*: comprimento 2,6 mm, largura 1,1 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,32 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,16 mm; II, 0,7 mm; III, 0,5 mm; IV, 0,5 mm. *Pronoto*: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,8 mm. *Cúneo*: comprimento 0,34 mm, largura na base 0,24 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada; olhos castanhos; sutura claval e margem interna do cúneo esverdeados, margens do embólio com traços de verde; antena castanho-clara, segmento I pálido.

Olhos situados no meio da cabeça, vértice