

pressa. Cabeça mais larga que longa, vértice marginado, desprovido de carena, fronte pontuda anteriormente, olhos grandes, salientes para fora, ultrapassando a margem lateral do pronoto, clípeo pouco saliente, jugo e loro normais, rostro curto, alcançando um pouco além das coxas anteriores. Antena cilíndrica, segmentos I e II de grossura aproximadamente igual, o primeiro segmento cerca de duas vezes mais curto que a largura do vértice, o segundo cerca de sete vezes mais longo que o II, segmentos III e IV afilados.

Pronoto trapeziforme, colar depresso, calos obsoletos, margens arredondadas, margem posterior reta, mesoescuto coberto, escutelo grande, aplainado.

Hemiélitros com embólio bem delineado, plano, alargado para o ápice. Cúneo mais longo que largo na base, membrana biareolada curta.

Pernas de comprimento médio, tíbias desprovidas de espinhos.

Espécie tipo do gênero: *Linhaesmiris viridis* n.sp.

Difere de *Rhinocapsidea* Reuter, 1908, pela textura do corpo, e comprimento dos segmentos da antena. Difere dos demais gêneros de rostro curto e vértice não carenado pela ausência de espinhos nas tíbias.

Linhaesmiris viridis n.sp.

(Figs. 1 - 4)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela estrutura da genitália do macho.

Macho: comprimento 4,1 mm, largura 1,7 mm. *Cabeça*: comprimento 0,4 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 1,5 mm; III-IV, mutilados. *Pronoto*: comprimento 0,8 mm, largura na base 1,2 mm. *Cúneo*: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,20 mm (holótipo).

Coloração geral verde com áreas castanhas; cabeça verde, olhos castanhos, antena e rostro pálido-amarelados.

Pronoto castanho-esverdeado, escutelo pálido a castanho-claro, ápice negro.

Hemiélitros verdes, membrana fusca.

Lado inferior e pernas pálido-amarelados, tíbias posteriores com fileiras longitudinais de dentículos esclerosados e espinhos castanhos, sem manchas negras na base.




Fig. 1 - *Linhaesmiris viridis* n. sp., macho, holótipo.

Cabeça pontuda na frente, olhos grandes, ultrapassando a margem lateral do pronoto, vértice reto, marginado, segmento I da antena mais curto que a largura do vértice entre os olhos, rostro muito curto, alcançando pouco além das coxas anteriores, pubescência semi-erecta.

Genitália: pênis (Fig. 2) com vésica reduzida, gonoporo secundário terminal, placa basal característica. Parâmero esquerdo (Fig. 3) com lobo basal muito desenvolvido, o ramo mais longo delgado e curvo na porção apical. Parâmero direito (Fig. 4) menor, simples, alargado na porção preapical, com cerca de 4 dentes esclerosados apicais.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Linhares, Espírito Santo, BRASIL, IX.1972, Roppa & Alvarenga col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro. *Parátipo*: macho, mesmas indicações que o tipo, na coleção do autor.

O nome específico é devido a sua coloração esverdeada.