

## Gênero *Paraproba* Distant, com Descrição de Novas Espécies (Hemiptera, Miridae)

(Gênero *Paraproba* Distant|Hemiptera|Miridae)

JOSÉ C. M. CARVALHO \*

Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ

Manuscrito aceito para publicação em 7 de maio de 1987

### INTRODUÇÃO

Com o surgimento do gênero *Adparaproba* Carvalho (na imprensa) surgiu a necessidade de proceder-se a uma revisão nas espécies até então incluídas em *Paraproba* Distant, 1884. Para esse mister, foram obtidas por empréstimo valiosas amostras do *Museu Britânico de História Natural*, Londres, através do colega W. R. Dolling; da extensa e representativa coleção do Professor J. C. Schaffner, *Departamento de Entomologia, Universidade de Texas A & M*; de tipos ou cótipos da *Coleção E. P. van Duzee, Academia de Ciências da Califórnia*, através do colega P. H. Arnaud Jr.; de valiosos exemplares do *Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América*, Washington, D.C. através do colega Thomas J. Henry e do *Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Nacional do México*, Cidade do México, remetidos pelo colega Harry Brailowsky. A esses prezados colegas os agradecimentos do autor.

\* \* \*

Os desenhos incluídos no texto foram elaborados por Paulo Roberto Nascimento e Maria Lília Gomide da Silva sob a supervisão do pesquisador.

\* \* \*

\* Pesquisador do *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)*.

### *Paraproba* Distant, 1884

*Paraproba* Distant, 1884: 270; Van Duzee, 1916:212; Carvalho, 1955:73.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado, liso, pubescência semiadpressa.

Cabeça mais larga que longa, vértice plano, arredondado, sem margem aparente, sem pescoço bem definido, olhos situados distantes do pronoto por espaço aproximadamente igual à grossura do segmento I da antena, fronte arredondada, antena cilíndrica, segmento I maior que a largura do vértice e menor que a largura da cabeça, segmento II três a quatro vezes mais longo que o I, segmentos III e IV mais finos, pubescência densa e curta; rostró longo, alcançando o ápice das coxas III ou até os segmentos III-V do abdome, segmento I não ultrapassando o colar.

Pronoto duas vezes mais largo que longo, colar deprimido, calos pouco salientes, margens laterais arredondadas, margem posterior levemente convexa, ângulos umerais arredondados; mesoescuto exposto, escutelo pouco saliente.

Hemiélitros com embólio relativamente estreito, cuneo aproximadamente duas a quatro vezes mais longo que largo na base, membrana longa, biareolada, aréolas alongadas.

Lado inferior com peritrema ostiolar bem definido, ostíolo largo, pernas longas e finas, sobretudo as tíbias posteriores, parempódio membranoso, convergente.