

Coloração geral ocrácea (pálido-amarelada) com áreas castanho-escuras a pretas; cabeça castanho-escura, região posterior do vértice pálida, olhos pretos, antena castanho-escura, segmento I pálido (mais claro), jugo avermelhado, loro, clipeo e gena pálidos.

Pronoto ocráceo, margem posterior e ângulos umerais pretos (cor essa que se estende à margem posterior da propleura); mesoescuto largamente exposto, com três manchas negras (uma central e uma em cada ângulo basal), escutelo pálido com faixa longitudinal triangular (base voltada para o mesoescuto) castanho-escuro.

Hemiélitros ocráceos, mancha interna na base do clavo, região comissural e ápice do mesmo (mais extensamente), faixa transversal no cório ao nível da comissura, estreitando-se para fora e sutura cório-embolial (embólio excluído) castanho-escuros.

Lado inferior e pernas pálidos.

Características morfológicas como mencionado para o gênero.

Genitália: não dissecada no lectótipo (a fim de não ser danificado).

Fêmea: semelhante ao macho em aspecto geral e coloração.

Exemplares estudados: lectótipo macho e paralectótipo fêmea, San Geronimo, Guatemala, Champion, na coleção do Museu Britânico de História Natural.

Difere das demais espécies do gênero pela faixa preta transversal posterior no disco do pronoto, unindo-se à mancha preta da porção posterior da propleura.

Os demais exemplares descritos como variedade de *fasciata* são representantes de outras espécies (*Paraproba nigroscutellata* n. sp. e *Paraproba fasciolata* Reuter).

***Paraproba fasciolata* Reuter, 1908**

(Figs. 32-40)

Paraproba fasciata Distant, 1884:270 var. a. *Paraproba fasciolata* Reuter, 1908:173.

Caracterizada pela morfologia da genitália do macho e pela coloração esverdeada do cúneo.

Macho: comprimento 4,4 mm, largura 1,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,24 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,4 mm; II, 1,5 mm; III, 0,7 mm; IV, 0,5 mm. *Pronoto*: comprimento 0,4 mm, largura na base 1,0 mm. *Cúneo*: comprimento 0,80 mm, largura na base 0,30 mm.

Coloração geral pálido-amarelada com áreas negras e esverdeadas; clipeo, mancha na frente e no vértice, olhos, antena (exceto segmento I), rostro pálidos.

Pronoto de coloração variável, geralmente com duas manchas no disco, contíguas as da propleura (de tamanho variável) ocupando os ângulos umerais, região mediana do mesoescuto, escutelo totalmente ou apenas nas margens laterais ou nestas e na base pretos.

Hemiélitros pálido-amarelados, clavo em toda extensão da sutura (geralmente mais largo ao lado do escutelo) e faixa transversal na região comissural do cório, afilada para fora (ou apenas indicada ou ausente) pretas, área apical do embólio e cúneo verdes a esverdeados (às vezes apenas a margem externa), nervuras da membrana fuscas.

Lado inferior do corpo pálido, propleura, lados do mesoescuto, meso e metapleura pretos em alguns exemplares (em outros ou completamente pálidos ou apenas a propleura negra).

Características morfológicas como indicadas para o gênero, rostro alcançando a base ou ápice das coxas III.

Genitalia: vésica do edeago (Figs. 35-37) formada por quatro espículos bem definidos; um mais longo que os demais e provido de pequenas farpas voltadas para trás, outro menor com farpas na sua metade apical e dois outros (fundidos) um sem farpas e outro com a extremidade apical recoberta por denticulos esclerosados. Parâmero esquerdo (Fig. 38) com excrescência mediana do lado dorsal provida de cerdas longas, extremidade apical afilada e recurva. Parâmero direito (Figs. 39-40) com pro-