

largura na base 0,8 mm. *Cúneo*: comprimento 0,80 mm, largura na base 0,22 mm.

Coloração geral pálido-amarelada com olhos, antena (exceto base dos segmentos I e II), nervuras da membrana e ápice do clipeo pretos. Lado inferior pálido-amarelado. Segundo Van Duzee a coloração tende a esverdeada em exemplares frescos.

Olhos muito pequenos, situados no meio da cabeça, distantes do pronoto pelo menos por 0,1 mm ou seja um pouco mais que a grossura do segmento I da antena (0,08 mm).

*Macho*: aspecto geral e coloração semelhantes à fêmea, vértice 0,28 mm.

*Genitalia*: vésica do edeago (Fig. 63) com espículo longo alargado na extremidade apical e outro menor retalhado no ápice. Parâmero esquerdo (Fig. 64) alargado no meio, com cerdas dorsais erectas e dente subapical. Parâmero direito (Fig. 65) com dente subapical e cerdas dorsais.

*Exemplares estudados*: 3 machos, 1 fêmea, parátipos, Laurel Dell. Lake Co., Cal., Aug. 3, 1916, E. P. Van Duzee; macho e fêmea, Shasta Co., Cal. VI.26.31, J. A. Kuschel col; fêmea, Carlotta, Ca. X.2.60, B. P. Bliven; fêmea, Fieldbrook, Humboldt Co., Cal., Sept. 3, 34, B. P. Bliven; fêmea, Miranda, Cal. Humboldt Co., VII.19.34, E. P. Van Duzee; fêmea, USA, Califórnia, Humboldt Co., Falk, 6.IX.1970, B. P. Bliven; 2 fêmeas, Pepperwood, Ca, Greelaw Cr. Bliven, 16.IX.73; macho e fêmea, Dyerville, Cal. VIII.4.63, B. P. Bliven; macho e fêmea, Miranda, Cal. Humboldt Co, VII.18.34, E. P. Van Duzee; 4 fêmeas, Klamath, Cal. Del Norte Co. VII.18.34, E. P. Van Duzee; macho, Oregon, Brookings, Carry Co, July 6-7, 1951, Borys Marking, CAS; 3 machos, USA, Or, Benton Co, Corvalli, 25 June-8 July, 1982, T. J. Henry, take of filbert *Cotylyus* sp.; fêmea, Eugene, Ore, VI.22.45, S.S. 26.942, filberts, 45.13852; macho, Bonneville, Ore, VII.4.1935, Oman, USNMNH; fêmea, Corvallis, Ore, June, 26, 1926, C. J. Drake, na coleção do autor.

Diferencia-se das demais espécies pela coloração negra das nervuras da membrana e ápice do cúneo, bem como pela morfologia da genitália do macho.

***Paraproba nigroscutellata* n. sp.**

(Figs. 66-68)

*Paraproba fasciata* Distant, 1884:270 var. c.

Caracterizada pela coloração do pronoto e margem externa do embólio.

*Fêmea*: comprimento 3,8 mm, largura 1,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,24 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,5 mm. *Pronoto*: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,8 mm. *Cúneo*: comprimento 0,60 mm, largura na base 0,22 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas negras; cabeça e segmento I da antena para a base pálidos, fronte mais escura (negra num exemplar), olhos e segmentos antenais II-IV negros.

Pronoto pálido-amarelado (com tonalidade terrosa) em sua maior extensão, colar, ângulos anteriores, margens laterais, ângulos umerais (em maior extensão), margem posterior no pronoto (mais finamente no meio) e escutelo (exceto ângulos basais) pretos, mesoescutito tendendo a cor de abóbora.

Hemiélitros pálidos, clavo infuscado internamente junto ao escutelo, cório com faixa transversal estreitada para fora ao nível da commissura corial (não cobrindo o cúneo), margem externa do embólio, margem externa do cúneo e sua extremidade apical, nervuras da membrana fuscas a pretos, porção extrareolar um pouco mais escura.

Lado inferior pálido, propleura, mesoescutito meso e metapleuras, faixas transversais nos segmentos abdominais e ovopositor negros (em dois exemplares todo segmento IX preto), coxas e pernas pálidas.

Características morfológicas como para o gênero, olhos mais próximos do pronoto, cúneo mais curto, porte menor.