

descritas até esta data, as do lado andino do Pacífico não apresentam faixa transversal negra nos hemiélitros, enquanto que as espécies cisandinas possuem a referida faixa.

As ilustrações que figuram no texto são de autoria de Paulo Roberto Nascimento e Maria Lilia Gomide da Silva.

Adparaproba n.gen.

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado, liso, revestido de pubescência adpressa, semiadpressa e cerdas erectas dos lados do colar.

Cabeça vertical, mais larga que longa, vértice arredondado, olhos ocupando os lados da cabeça e contíguos ao pronoto, margem posterior lisa, clipeo pouco saliente, jugo, loro e gena planos; rostro longo, alcançando ou ultrapassando um pouco as coxas III, segmento I não ultrapassando o xifo do prosterno; antena cilíndrica, segmento I de comprimento aproximado da largura do vértice, segmento II mais longo que os demais, levemente engrossado para o ápice, segmentos III e IV finos, revestidos de pubescência densa e curta.

Pronoto mais largo que longo, colar deprimido, calos pouco salientes (com cerdas erectas), margens laterais do disco arredondadas, margem posterior levemente convexa no meio, ângulos umerais normais; mesoescuto exposto, escutelo moderadamente elevado.

Hemiélitros com embólio explanado, de largura média, cúneo mais longo que largo na base (aproximadamente duas vezes mais longo que largo), membrana longa, biareolada, aréola maior alongada.

Lado inferior com peritrema ostiolar distinto, pernas longas e finas, fêmures com cerdas longas inferiormente, tíbias com fileiras de minúsculos denticulos, pêlos curtos e espinhos finos, curtos e claros.

Espécie tipo do gênero: *Adparaproba carioca* n.sp.

Aproxima-se muito de *Paraproba* Distant, 1884, diferenciando-se sobretudo pela posição dos olhos (praticamente contíguos ao pronoto, enquanto que em *Paraproba* os olhos são distantes do colar por distância equivalente pelo menos a grossura do segmento I da antena), cúneo mais curto (cerca de duas vezes mais longo que largo na base, enquanto no gênero de Distant esta proporção é de aproximadamente três vezes mais longo que largo na base).

O nome genérico é alusivo à semelhança entre os gêneros.

CHAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE *ADPARAPROBA*:

1. Hemiélitros sem faixas transversais de cor escura 2
- Hemiélitros com faixa ou faixas transversais escuras 3

2. Cabeça e segmento I da antena totalmente pretos *SINGULARIS* (Carvalho e Gomes)
- Cabeça clara ou com mancha clara no vértice; segmento I da antena pálido pelo menos na base *PERUANA* (Carvalho e Ferreira)
3. Escutelo preto com faixa longitudinal pálida em toda sua extensão
- *BINOTATA* (Carvalho e Ferreira)
- Escutelo com apenas a porção apical pálida 4
4. Mancha transversal do hemiélitro com porção anterior e posterior bem divididas, unidas apenas na comissura corial 5
- Mancha transversal do hemiélitro com porção posterior e posterior fundidas pelo menos até seu meio 6
5. Clavo claro com mancha negra basal ao lado do escutelo *ITATIAIANA* n.sp.
- Clavo de coloração escura uniforme
- *BOLIVIANA* n.sp.
6. Clavo preto em toda sua extensão 7
- Clavo pálido ou quando negro, apenas dos lados do escutelo 9
7. Mancha transversal do cório acentuadamente negra pálidas apenas junto ao embólio
- *GABRIELI* n.sp.
- Mancha transversal do cório pálida pelo menos até sua metade 8
8. Região do disco posterior aos calos com uma faixa pálida em forma de T . *DISPERSA* n.sp.
- Região do disco posterior aos calos totalmente negra *CARIOCA* n.sp.
9. Clavo com mancha negra bem marcada dos lados do escutelo *PIRANGA* n.sp.
- Clavo sem mancha negra bem marcada dos lados do escutelo *NOVATEUTONIA* n.sp.

Adparaproba boliviana n.sp.

(Figs 1-3)

Caracterizada pela coloração do cório e pela morfologia dos parâmeros do macho.

Fêmea: comprimento 4,8 mm, largura 1,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,8 mm, vértice 0,40 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,5 mm; II, 1,7 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: comprimento 0,6 mm, largura na base 1,0 mm. *Cúneo*: comprimento 0,70 mm, largura na base 0,36 mm (holótipo).

Coloração geral pálida com áreas castanho-escuras; cabeça (exceto região lateral, margem dos olhos e margem posterior do vértice) preta, segmento I da antena pálido; pronoto castanho com região anterior e margens laterais negras, margem posterior do disco largamente pálida; mesoescuto pálido dos lados, negro no meio, escutelo negro com grande mancha pálida no meio e extremidade apical; hemiélitro pálido, clavo e duas manchas paralelas ao