

meio, ângulos umerais salientes, margem posterior largamente arredondada; mesoescuto exposto, escutelo plano.

Hemiélitros alargados ao nível do ápice do clavo, embólio largo e explanado, cúneo aproximadamente tão longo quanto largo na base, membrana curta, biareolada.

Lado inferior com peritrema ostiolar grande, ostíolo saliente, fêmures e tíbias de comprimento médio, revestidas de pêlos curtos e cerdas longas, erectas.

Espécie tipo do gênero: *Boliviomiris antennalis* n.sp.

Aproxima-se bastante no seu aspecto geral de

Boliviomiris antennalis n.sp.
(Figs 1-3)

Caracterizada pela grossura e pilosidade da antena bem como pela fossa preta na base do clipeo.

Fêmea: comprimento 5,4 mm, largura 2,4 mm.

Antena: segmento I, comprimento 0,7 mm; II, 2,0 mm; III e IV mutilados. *Pronoto*: comprimento 0,8 mm, largura na base 1,7 mm. *Cúneo*: comprimento 0,46 mm, largura na base 0,44 mm (holótipo).

Corpo pálido-amarelado a pálido-sujo marmoreado de castanho e com manchas castanho-es-

curas; antena II com aproximadamente 5 faixas negras, pronoto marmoreado de castanho, embólio com aproximadamente 8 manchas negras em sua superfície, comissura corial, paracuneus e ápice do cúneo negros; membrana fusca, nervuras negras. Clipeo com mancha preta aveludada na base.

Lado inferior pálido-amarelado, lados da região esternal e do abdome com uma faixa longitudinal de manchas negras, fêmures com faixas escuras transversas e juntamente com as tíbias salpicados de pontos avermelhados ou castanhos.

Características morfológicas como indicado para o gênero.

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, BOLIVIEN, Prov. Sara, Steinbach S., na coleção do Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América, Washington, D.C.

O nome específico é alusivo à sua antena, grossa e com cerdas longas e erectas.

Guaicurua n.gen.

Platytomatocoris Carvalho, 1946 nec Reuter

Orthotylinae, Orthotylini. Corpo alongado, liso, levemente rugoso no pronoto e escutelo, revestido de pêlos escamosos e semiadpressos.

Cabeça horizontal, vértice plano, marginado, olhos alongados, contíguos ao pronoto, deprimidos, não alcançando a gula inferiormente, fronte arredondada, bem separada do clipeo que é muito largo e saliente, podendo ser visto de cima; antena com segmento I grosso e mais curto que o vértice, cilíndrico, engrossado para o ápice, segmento II foliáceo, cilíndrico apenas na base e no ápice, segmentos III e IV muito curtos e finos, todos revestidos de pubescência muito curta; rostró curto, alcançando o meio do mesoesterno, segmento I não ultrapassando o collar.

Pronoto plano, margens laterais arredondadas, collar deprimido, calos obsoletos, margem posterior levemente convexa, mesoescuto exposto, escutelo plano, rugoso transversalmente.


Hemiélitros com embólio estreito, cúneo mais longo que largo na base, membrana biareolada, aréolas alongadas.

Lado inferior do corpo com peritrema ostiolar bem marcado, pernas de comprimento médio, tíbias com pêlos e espinhos curtos.

Espécie tipo do gênero: *Platytomatocoris brasiliensis* Carvalho, 1946.

Diferencia-se dos demais gêneros de Orthotylini pela morfologia dos segmentos I e II da antena, corpo liso, com pêlos escamosos e pelos semiadpressos, sobretudo por ter ambos os segmentos I e II da antena grossos (o segundo foliáceo).

O nome genérico é alusivo aos índios Guaikurus que habitavam a região no passado.



Boliviomiris antennalis n.sp.: Fig. 1 - fêmea, holótipo; Fig. 2 - segmentos I e II da antena; Fig. 3 - cabeça vista de lado.