



*Falconia antioquiana* n.sp.: Fig. 4 – macho, holótipo; Fig. 5 – pênis; Fig. 6 – parâmero esquerdo; Fig. 7 – parâmero direito.

*Exemplares estudados:* 12 machos e 8 fêmeas, Quito, ECUADOR, IX.1962, JCMC col.; macho e fêmea, Conocoto, Ecuador, on Euphorbiacea. Pomasqui, Ecuador, VIII.1962, JCMC col.

Aproxima-se bastante de *Falconia incaica* n.sp. diferenciando-se dela por ter o cúneo completamente pálido-amarelado.

*Falconia antioquiana* n.sp.  
(Figs 4-7)

Caracterizada pela coloração predominante-

mente negra e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho:* comprimento 3,6 mm, largura 1,1 mm. *Cabeça:* comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vértece 0,30 mm. *Antena:* segmento I, comprimento 0,5 mm; II, 1,2 mm; III, 0,6 mm; IV, 0,2 mm. *Pronoto:* comprimento 0,6 mm, largura na base 1,1 mm. *Cúneo:* comprimento 0,40 mm, largura na base 0,22 (parátipo).

Coloração geral preta com áreas pálido-amareladas; cabeça (exceto vértece), olho, antena, pro-