

noto, mesoescudo, escutelo, clavo, porção comissural do cório, ápice e margem interna apical de cúneo, nervuras da membrana pretos.

Lado inferior preto, porção mediana do abdome, coxas e pernas pálido-amareladas.

Cúneo grande, triangular, escutelo levemente rugoso transversalmente, rostro curto, alcançando o ápice das coxas I.

*Genitália*: pênis (Fig. 5) com região apical dos prolongamentos pós-gonóporo secundário alargado e com pequenas excrecências. Parâmero esquerdo (Fig. 6) curvo, com uma excrecência característica um pouco além do meio e cerdas dorsais longas. Parâmero direito (Fig. 7) engrossado na porção apical, com numerosas cerdas e um pequeno denticulo marginal esclerosado.

*Fêmea*: semelhante ao macho em coloração e aspecto geral.

*Holótipo*: macho, Antioquia, COLOMBIA, VIII.5.1977, E. Urueta & Higuerilla, na coleção do

Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos da América do Norte, Washington D.C. *Parátipos*: 33 machos e fêmeas, mesmas indicações que o tipo, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro e do autor. Difere das demais espécies do gênero pela extensão da coloração preta e pela morfologia da genitália do macho.

O nome específico é alusivo à Província de Antioquia onde os exemplares foram coletados.

*Falconia balloui* (Knight e Carvalho, 1943)

*Baculodema balloui* Knight e Carvalho, 1943:139;


*Falconia balloui* Carvalho, 1958:61

(Figs 8-11)

Caracterizada pela sua coloração negra, pela metade apical do cório e embólio arcuados para baixo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 3,2 mm, largura 0,8 mm,

*Cabeça*: comprimento 0,2 mm, largura 0,7 mm, vér-



*Falconia balloui* (Knight & Carvalho): Fig. 8 – macho, parátipo; Fig. 9 – pênis; Fig. 10 – parâmero esquerdo; Fig. 11 – parâmero direito.