

Cabeza: longitud 0,3 mm, ancho 0,9 mm, vertex 0,47 mm. **Antena:** segmento I, longitud 0,45 mm, II, 1,4 mm, III, 0,8 mm, IV, quebrado. **Pronoto:** longitud 0,55 mm, ancho en la base 1,0 mm. **Cúneo:** longitud 0,5 mm, ancho en la base 0,30 mm. (Holotipo).

Coloración general castaño clara, frente con margen de los ojos y línea mediana, pálidas, embolium del mismo color. Membrana oscura.

Lado inferior del mismo color, con cabeza y coxas pálidas. Patas castaño claras. Fémures con una línea semicircular de puntos en el tercio apical.

Cuerpo superiormente rugoso, con pelos largos, erectos, blanquecinos. Rostro alcanzando las coxas posteriores.

Lado inferior revestido por pilosidad del mismo tipo, más adpressa. Fémures y tibias con pilosidad del mismo tipo, sin cerdas largas en tibias.

Genitália: vésica (Fig. 21, 22) con dos lobos esclerosados, ambos serrados en el apice. Parámero izquierdo (Fig. 23) curvo, afilado en dirección a la extremidad apical. Parámero derecho (Fig. 24) con cinco dientes apicales.

Hembra: semejante al macho en dimensiones y coloración, sólo presentando el pronoto más claro.

Holotipo: macho Neuquén, Argentina, en la colección del segundo autor. **Paratipos:** 1 macho y 4 hembras, iguales indicaciones que para el holotipo, en las colecciones del primer y segundo autor.

Difiere de *H. sanluisensis* n. sp. a la cual más se aproxima, por su coloración, su distinta pilosidad y mensuraciones, así como por la estructura de la genitália del macho.

El nombre específico está dado por la región argentina que, entomológicamente, es muy rica aún poco estudiada.

***Hadronemella rionegrensis* n. sp.**
(Figs. 25 - 28)

Caracterizada por la coloración de la cabeza y por la morfología de la genitália del macho.

Macho: longitud 4,0 mm, ancho 1,4 mm. **Cabeza:** longitud 0,2 mm, ancho 1,0 mm, vértice 0,50 mm. **Antena:** segmento I, 0,2 mm, II, 1,2 mm, III, 0,8 mm, IV, 0,4 mm. **Pronoto:** longitud 1,0 mm, ancho en la base 1,1 mm.

Cúneo: longitud 0,60 mm, ancho en la base 0,40 mm (Holotipo).

Coloración general castaño con áreas castaño oscuras y amarillo pálido; cabeza con área junto a los ojos, mancha en la frente y margen posterior del vértice pálidas, pronoto, mesoescutum y escutelo castaño oscuro, hemielitros y membrana castaños.

Lado inferior castaño oscuro yugo, base del lorum y base de la gena, rostro, coxas, peritrema ostiolar para el ápice y abdomen inferiormente (entre el II y el VII segmentos ventralmente) y patas pálidas.

Cuerpo densamente piloso, cabeza, sobretodo en el vértice y anteriormente en el pronoto, con cerdas largas, erectas, rostro alcanzando la base de las coxas III.

Genitália: vesica (Fig. 26) con dos espículos esclerosados, uno menor serrado y otro mayor con pocas espinas en el medio. Parámero izquierdo (Fig. 27) curvado, con numerosas cerdas en su superficie, parte apical retorcida, como muestra la ilustración. Parámero derecho (Fig. 28) alargado y bifurcado en la extremidad apical, con dentitos característicos como muestra la figura.

Hembra: desconocida.

Holotipo: macho, Cnel. Gomes, Rio Negro, XI-45, en la colección Carpintero.

Se separa de las demás especies por la coloración del cuerpo y por la morfología de la genitália del macho.

El nombre específico se refiere a la Provincia de Rio Negro, Argentina, donde el tipo fué colectado.

***Hadronemella sanluisensis* n. sp.**
(Figs. 29 - 33)

Caracterizada por su coloración, su pequeño porte y por la estructura de la genitália del macho.

Macho: longitud 3,0 mm, ancho 1,1 mm. **Cabeza:** longitud 0,2 mm, ancho 0,9 mm, vertex 0,37 mm. **Antena:** segmento I, longitud 0,2 mm, II, 0,8 mm, III, 0,7 mm, IV, 0,2 mm. **Pronoto:** longitud 0,4 mm, ancho en la base 1,1 mm. **Cúneo:** longitud 0,6 mm, ancho en la base 0,37 mm. (Holotipo).

Coloración general castaño, con áreas negras. Cabeza castaño clara con tres manchas negras en el vertex, antenas negras, excepto segmento I, que es castaño claro con extrema base y extremo ápice negros. Pronoto negro