



*Sericophanes ocellatus* Reuter: Fig. 43 – pigóforo; Fig. 44 – parâmero direito; Fig. 45 – parâmero esquerdo (exemplar de College Station, Texas). *Sericophanes heidemanni* Poppius: Fig. 46 – pigóforo; Fig. 47 – parâmero direito; Fig. 48 – parâmero esquerdo (exemplar de Michigan).

*Sericophanes heidemanni* Blatchley; 1926: 83,  
fig. 180; Carvalho, 1944: 529, figs. 25 - 27.  
(Figs. 46 - 48)

Pelas mesmas razões mencionadas atrás, as figuras da genitália dessa espécie acham-se reproduzidas novamente neste trabalho.

Chave para identificação das espécies de *Sericophanes* Reuter, da América do Sul e América Central:

1. Coloração da cabeça, pronoto, escutelo e abdome preta; apenas a fêmea conhecida – Argentina ..... *niger* Poppius
- Coloração do corpo de outra cor; machos conhecidos ..... 2
2. Clavo sem mancha ocelóide pálido-amarealada ou brancacentra nítida; hemiélitros com apenas uma mancha castanha em forma de

- |  |
|--|
| avião – Argentina .....<br>Carvalho e Wallerstein<br>– Clavo com mancha ocelóide bem marcada .<br>..... 3<br>3. Corpo revestido superiormente com cerdas longas e eretas; olhos com pêlos longos ..<br>..... 4<br>– Corpo revestido superiormente com pêlos curtos; olhos sub-glabros ..... 7<br>4. Mancha ocelóide do clavo grande, alcançando a sutura clavo-corial e a comissura claval ..... 5<br>– Mancha ocelóide do clavo pequena, não alcançando a sutura clavo-corial e a comissura claval ..... 6<br>5. Mancha ocelóide grande e arredondada; córilo mais claro ao nível da mancha ocelóide. Colômbia, Venezuela ..... <i>boliviensis</i> n. sp. |
|--|