

Catarinea plaumanni n.sp.

(Fig. 3)

Caracterizada pela coloração do corpo.

Fêmea: comprimento 7,2 mm, largura 2,8 mm. **Cabeça:** comprimento 0,8 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,66 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 1,8 mm; III, 1,0 mm; IV, 0,7 mm. **Pronoto:** comprimento 1,2 mm, largura na base 2,4 mm. **Cúneo:** comprimento 1,10 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo castanho a castanho-escuro com áreas pretas e pálidas; cabeça clara, olhos e antenas castanho-escuros.

Pronoto com pontos pretos sobre os calos, colar mais escuro anteriormente, disco castanho a castanho-escuro com manchas claras (marmoreadas), faixa longitudinal submarginal as margens laterais e área posterior mais escuras; mesoescuto descoberto, escutelo castanho com mancha preta ou negra apical.

Hemiélitros castanhos, marmoreados de claro (sobretudo no exocório), cobertos por pêlos dourados, esparsos, curtos, cúneo externamente e membrana na parte extrareolar mais escuros, nervuras castanhas.

Lado inferior do corpo castanho, mais escuro na parte posterior da propleura e lados do mesoesterno, pernas castanhas, tíbias com pêlos e espinhos curtos (menores que a largura das mesmas).

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, BRASIL, Nova Teutonia, Santa Catarina, 27°11'N-52°23'W, nov. 1974, Fritz Plaumann col., na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Caracterizada sobretudo pela coloração do pronoto.

O nome específico é dado em homenagem a Fritz Plaumann, que colecionou numerosas espécies de mirídeos em Santa Catarina, especialmente em Nova Teutonia.

Guianella paraiensis n.sp.

(Figs. 1, 10-12)

Caracterizada pela coloração do pronoto e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 5,2 mm, largura 2,1 mm. **Cabeça:** comprimento 0,5 mm, largura 1,1 mm, vértice 0,42 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 2,0 mm; III, 1,1 mm; IV, mutilado. **Pronoto:** comprimento 0,7 mm, largura na base 2,0 mm. **Cúneo:** comprimento 0,60 mm, largura na base 0,42 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo pálido-terrosa, marmoreada de castanho a castanho-escuro; cabeça pálida, mancha semilunar no vértice, fronte com faixa vermelha longitudinal no meio, estriada obliquamente de castanho, olhos castanho-escuros; antena com segmento I pálido, tendo em sua superfície pontos avermelhados, II mais pálida na base (escurecendo-se para o ápice), III castanha; base entre o clipeo e a fronte com faixa transversal avermelhada, restante da cabeça pálida, pescoço com faixa mediana castanha e duas manchas laterais avermelhadas.

Pronoto pálido, colar com faixa mediana castanho-escuro e duas laterais castanhas, calos marmoreados de castanho, disco com duas faixas castanho-escuras laterais e uma mediana da mesma cor, ângulos umerais pretos, voltados para frente, em forma de espinhos; mesoescuto exposto, com faixa mediana castanho-escuro e dois pontos laterais; escutelo pálido, com duas manchas negras mediana, de cada lado.

Hemiélitros pálidos, marmoreados de castanho (com áreas mais escuras e mais claras), comissura claval mais clara que o restante, margem extrema externa do embólio e do cúneo avermelhadas, este último com ápice castanho-escuro; membrana pálida, nervuras castanhas.

Lado inferior do corpo pálido, propleura com 3 faixas longitudinais: a superior e mediana castanha e a inferior avermelhada, mesoescuto castanho-escuro dos lados e no meio, meso e metapleuras avermelhadas no ápice; abdome pálido, com faixa longitudinal superior interrompida nos anéis, avermelhadas para a base, pigóforo escuro na região inferior; fêmures pálidos, salpicados de pontos ou manchas avermelhadas; o par posterior com um anel subapical, tíbias pálidas.

Genitália: vésica (Fig. 10) característica, bifurcada na região subapical, prolongamento com