



*Neosilia cineracea* Distant: Fig. 19 – macho, parátipo; Fig. 20 – parâmetro esquerdo; Fig. 21 – parâmetro direito; Fig. 22 – pigóforo.

Champion. coleção do Museu Britânico de História Natural.

Difere das demais espécies do gênero pela coloração do hemiélitro, pelo comprimento do cúneo e pela morfologia da genitália do macho.

*Neosilia dollingi* n.sp.

(Fig. 23)

Caracterizada pela coloração do hemiélitro e pelo comprimento do cúneo.

*Fêmea*: comprimento 5,8 mm, largura 1,6 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura 0,7

mm, vértice 0,44 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,8 mm; II, 2,3 mm; III e IV mutilados. *Pronoto*: comprimento 0,9 mm, largura na base 1,4 mm. *Cúneo*: comprimento 0,90 mm, largura na base 0,42 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada, translúcida; pronoto tendendo ao citrino, olhos castanhos, antena negra (segmento I mais claro, tendendo ao fuscão), sutura claval, margem interna do cório, margem interna, ápice e margem externa do cúneo, margem externa do embólio (aproximadamente até sua metade) negros, nervura da membrana fuscã.

Lado inferior pálido-amarelado, coxas e pernas pálidas, fêmures com pequena mancha negra na extremidade apical externa, tarsos negros.

Corpo finamente pontuado (inclusive no hemiélitro), pêlos muito curtos, semierectos, rostró alcançando as coxas medianas, antena com segmento I mais grosso para a base, fêmures e tíbias revestidos com cerdas finas, longas, erectas.

*Macho*: desconhecido.

*Holótipo*: fêmea, COSTA RICA, Turrialba, CATIE/IICA Research Station, 3-8.VII.1981, W. R. Dolling col., na coleção do Museu Britânico de História Natural, Londres. *Parátipo*: fêmea, mesmas indicações que o tipo.

Difere de *Neosilia cineracea* (Distant, 1884) pela coloração do hemiélitro, pelo comprimento do cúneo e do segmento II da antena.

O nome específico é dado em homenagem ao colega W. R. Dolling do Museu Britânico de História Natural que coligiu esta espécie e outras na Costa Rica e no México.

*Neoleucon sulinus* n.sp.

(Figs. 24 - 27)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 5,1 mm, largura 2,0 mm. *Cabeça*: comprimento 0,5 mm, largura 1,2 mm, vértice 0,70 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,6 mm; II, 1,3 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,8 mm. *Pronoto*: comprimento 1,1 mm, largura na base 1,5. *Cúneo*: comprimento 1,20 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Coloração geral lútea com áreas pretas; fronte, antena (exceto base do segmento I), clipeo e loro pretos.

Pronoto lúteo com duas manchas sobre os ângulos laterais posteriores, prolongadas longitu-