



Halldapoides guaranianus Carvalho: Fig. 15 – macho parátipo; Fig. 16 – pênis; Fig. 17 – parâmetro esquerdo; Fig. 18 – parâmetro direito.

po todavia encontra-se no Museu de Helsinky, Finlândia, tendo sua genitália sido ilustrada neste trabalho.

Estudo recente revelou ser *Laemacoridea* Poppius sinônima de *Sericophanoides* Carvalho e Rosas, 1965, correção feita no presente estudo. Ao mesmo deverão ser agregadas as espécies: *Sericophanes dispersus* Carvalho, 1944 holótipo; *Sericophanoides punctatus* Carvalho e Rosas, 1965; e *Sericophanes constrictus* Maldonado, 1970, colecionados respectivamente em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Brasil e Hope, próximo de Georgetown, Guiana (*n. comb.*).

A distribuição geográfica do gênero até o presente passa a ser: Rio Salado, Santiago del Estero; Zalapar; Departamento de San Javier, ARGENTINA; Aragarças, Goiás; Corumbá, Mato Grosso; Barra, Bahia; Campinas, São Paulo; Pará, Brasil; Estância Primera, Distrito Caaguazu, PARAGUAI.

Laemacoridea quadrimaculata Poppius, 1921
Laemacoridea quadrimaculata Poppius, 1921:
 51.(Figs. 19 – 23)

Caracterizada pela coloração, pela morfologia do embólio e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,9 mm, largura 1,2 mm. *Cabeça*: comprimento 0,3 mm, largura 0,7 mm, vértice 0,26 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,3mm; I, 0,9 mm; III, 0,7 mm; IV, mutilado. *Pronoto*: comprimento 0,7 mm, largura na base 1,0 mm. *Cúneo*: Comprimento 0,60 mm, largura na base 0,40 mm (holótipo).

Coloração geral castanha com áreas pálidas (brancacentas); olhos castanho-escuros, antena pálido-amarelada a castanho-claro, hemiélitros castanhos, cúneo mais escuro, duas manchas pálidas, brancacentas: uma na base e outra no ápice do hemiélitro (incluindo o embólio e o exocório), membrana fusca.

Lado inferior castanho (tendendo ao avermelhado), rostro, coxas e base do abdome pálidos, pigóforo castanho escuro, fêmures para o ápice e tíbias castanhos.

Corpo revestido por cerdas longas, erectas, segmento I da antena com 2 – 3 cerdas erectas, segmento II com pilosidade curta, densa, vértice convexo, marginado, rostro alcançando as tíbias II, peritrema ostiolar grande, tíbias III com espinhos (7 – 8) longos do lado externo, pronoto e hemiélitros pontuados.

Genitália: pênis (Fig. 20) do tipo *Orthotyluini* Van Duzee, 1916, com espículo