

I, comprimento 0,6 mm; II, 1,8 mm; III, 0,8 mm; IV, 0,6 mm. *Pronoto*: comprimento 1,1 mm, largura na base 2,1 mm. *Cúneo*: comprimento 0,90 mm, largura na base 0,80 mm (holótipo).

Coloração geral lutescente com áreas pretas; olhos, antena (exceto extremo base dos segmentos III e IV), ápice do cúneo (este último com tendência a avermelhado) pretos.

Lado inferior do corpo lutescente, ápice do clipeo, ápices dos fêmures, tíbias I e II e tíbias III, exceto porção apical pretos.

Corpo pontuado, revestido de pubescência curta, semiadpressa, densa, calos obsoletos, olhos contíguos ao colar, antena cilíndrica, rostru ultrapassando muito pouco as coxas I.

*Macho*: desconhecido.

*Holótipo*: fêmea, Ponta Grossa, Vila Velha, Paraná, BRASIL, 14.X.1972, Pe. Jesus S. Moure, na coleção do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. *Parátipos*: três fêmeas, mesmas indicações que o tipo, na coleção acima e do autor.


O nome específico é alusivo a sua coloração.

*Orthotylus ricardoi* n. sp.

(Figs. 29 - 33)

Caracterizada pela coloração uniforme do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

*Macho*: comprimento 3,6 mm, largura



*Orthotylus ricardoi* n. sp.: Fig. 29 - macho, holótipo; Fig. 30 - pênis; Fig. 31 - parâmetro esquerdo; Fig. 32 - ápice do parâmetro esquerdo; Fig. 33 - parâmetro direito.