

ologia da Universidade de São Paulo e Levantamento Entomológico da Fauna do Estado do Paraná, cujas descrições e ilustrações acham-se incluídas no presente trabalho.

As figuras no texto são de autoria de Luiz Antonio Alves Costa, Paulo Roberto Nascimento e Maria Lilia Gomide da Silva, sob a supervisão do autor.

Clypeocoris n. gen.

Bryocorinae, bryocorini. Espécie de tamanho muito pequeno, revestida por pilosidade erecta e fina.

Cabeça vertical, arredondada, olhos salientes para fora, contíguos ao pronoto, vértice arredondado, pedúnculo da antena situado na região mediana dos olhos, fronte reta, clípeo muito saliente, fortemente projetado para frente (Fig. 2), achatado dos lados, ápice arredondado, búcua abrangendo o segmento I do rostro que é largo e comprido, alcançando o meio das coxas I, epifaringe ocupando a metade do segmento, gula muito curta; antena cilíndrica, segmento I cerca de 3 vezes mais curto que a largura do vértice, segmento II cerca de quatro vezes mais longo que o I, segmentos III e IV muito finos, pubescência longa, comprimento igual ou maior que a largura dos segmentos.

Pronoto fortemente pontuado, exceto na área dos calos, porção anterior muito larga, convexa na frente, disco estreitado na área dos calos, margem posterior largamente arredondada, ângulos umerais salientes, também arredondados: mesoescuto coberto, escutelo pequeno, excavado no meio.

Hemiélitros com embólio bastante engrossado, sutura córioembolial com fileira de pontuações bem visíveis, clavo longo, cúneo e membrana caídos para trás, aréola única, grande, ocupando metade da membrana.

Lado inferior do corpo com rostro alcançando as coxas III.

Espécie tipo do gênero: *Clypeocoris amazonicus* n. sp.

O gênero é caracterizado pela extensão e morfologia do clípeo, pela pilosidade da antena e extensão do rostro.

O nome genérico é alusivo ao clípeo.

Clypeocoris amazonicus n. sp.

(Figs. 1 - 5)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,2 mm, largura 0,8 mm. *Cabeça*: comprimento 0,1 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,36 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,1 mm; II, 0,4 mm; III, 0,2 mm; IV, 0,1 mm. *Pronoto*: comprimento 0,4 mm, largura na base 0,7 mm. *Cúneo*: comprimento 0,16 mm, largura na base 0,10 mm (holótipo).

Coloração geral castanha tendendo ao avermelhado com áreas citrinas ou lutescentes; pronoto (exceto área dos calos) citrino a lutescente, extremo ápice do cório, cúneo e nervuras da membrana castanhos ao avermelhados, base do segmento I da antena, segmentos III e IV pálidos.

Lado inferior do corpo castanho-escuro, propleura citrina superiormente, fêmures para a base e ápice das coxas pálidos.

Características morfológicas como indicadas para o gênero.

Genitália: penis (Fig. 3) do tipo Bryocorini, como mostra a ilustração, canal seminal distal longo, placa basal grossa. Parâmero esquerdo (Fig. 4) bastante curvo, com lobo basal com cerdas e ápice rombudo. Parâmero direito (Fig. 5) curto, largo, bifurcado na região apical e com cerdas dorsais, estreitado na região subapical.

Fêmea: desconhecida.

Holótipo: macho, Maturacá, Estado do Amazonas, Alto Rio Cauboris, Brasil, 28.XII.62 - 5.I.63, J. Bechyné col., na coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

O nome específico é alusivo ao Estado do Amazonas onde o exemplar tipo foi coletado.

Cylapocoroides n. gen.

Cylapinae, Cylapini. Corpo compacto, revestido de pubescência densa, erecta, pronoto pontuado entre e atrás dos calos, bem como dos lados e parcialmente no meio do disco.

Cabeça com olhos grandes, contíguos ao pronoto, vértice marginado, depresso no meio,