



Cyrtotylus antoninensis n. sp: Fig. 10 - fêmea, holótipo; Fig. 11 - cabeça e pronoto, vistos de lado.

mento 0,40 mm, largura na base 0,22 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas vermelhas; cabeça com três faixas longitudinais vermelhas (a mediana alcançando a base do vértice), olhos e clipeo também vermelhos, segmento I da antena na base e no ápice avermelhado.

Pronoto pálido com 10 faixas longitudinais vermelhas: uma em cada margem externa, duas sub-laterais unidas na extremidade apical e quatro medianas avançando sobre os calos; escutelo com duas faixas longitudinais e uma mediana vermelhas.

Hemiélitro marmoreado de vermelho com mancha pálida bem marcada no clavo (Fig. 10), cúneo com ápice e faixa transversal fina na base vermelhos.

Lado inferior do corpo e pernas pálido-amarelados.

Rostro alcançando as coxas III.

Macho: desconhecido.

Holótipo: fêmea, Antonia, PR (Estado do Paraná, Reserva Sapitanduva, Brasil, 03.XI.1986, Lev. Ent. Profaupar., lâmpada, na coleção do Museu Nacional, Rio de Janeiro.

Diferencia-se das demais espécies do gênero pela coloração da cabeça e do pronoto.

O nome específico é alusivo a cidade de Antonina, em cujo município encontra-se a Reserva de Sapitanduva.

Cyrtotylus catarinensis n. sp.
(Figs. 12 - 16)

Caracterizada pela coloração pálido-amarelada e vermelha do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 2,8 mm, largura 1,1 mm. *Cabeça*: comprimento 0,1 mm, largura 0,5 mm, vértice 0,30 mm. *Antena*: segmento I, comprimento 0,2 mm; II, 0,8 mm; III, 0,4 mm; IV, 0,3 mm. *Pronoto*: comprimento 0,3 mm, largura na base 0,9 mm. *Cúneo*: comprimento 0,40 mm, largura na base 0,26 mm (holótipo).

Coloração geral pálido-amarelada com áreas avermelhadas a cor de laranja; cabeça pálido-amarelada com faixa longitudinal estreita sobre a frente e pequena mancha sobre o jugo vermelhas antena pálida, segmento I vermelho na extrema base e no ápice; rosto pálido; olhos vermelhos.

Pronoto pálido-amarelado com duas manchas sobre os calos e quatro outras (as externas mais longas) avermelhadas; mesoescuto pálido com duas manchas vermelhas escutelo pálido-amarelado com região apical vermelha.

Hemiélitros pálido-amarelados, salpicados ou marmoreados de vermelho (vide ilustração de corpo inteiro), extrema base e ápice do cúneo vermelhas, membrana fusca, nervuras alaranjadas.

Lado inferior pálido-amarelado, ápice