



Resthenia araguana n.sp.: Fig. 49 - macho, holótipo; Fig. 50 - vésica do eedeágo; Fig. 51 - parâmero esquerdo; Fig. 52 - parâmero direito.

trando uma curvatura apical, vésica membranaosa e canal seminal simples. Parâmero esquerdo (Figs. 46, 47) complexo, como mostram as ilustrações. Parâmero direito (Fig. 48) muito pequeno, ápice afilado.

Holótipo: fêmea, Prima, Colombia, Santander del Norte, 1.700 m, 27.V.1965, J. e B. Bechyné leg., na coleção do Museu de Entomologia, Escola Superior de Agricultura, Maracay, Venezuela. **Parátipo:** macho, mesmas indicações que o tipo, na coleção do autor.

Difere das outras espécies do gênero pela coloração do corpo e pela morfologia dos parâmeros do macho.

O nome específico é alusivo ao país onde os tipos foram colecionados.

***Resthenia araguana* n.sp.**

(Figs. 49 - 52)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Fêmea: comprimento 12,8 mm, largura 4,0 mm. **Cabeça:** comprimento 0,6 mm, largura 1,6 mm, vértice 0,90 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 1,6 mm; II, 2,8 mm; III, 3,6 mm; IV, 0,8 mm. **Pronoto:** comprimento 1,8 mm, largura na base 2,8 mm. **Cúneo:** comprimento 2,10 mm, largura na base 0,60 mm (holótipo).

Coloração geral preta com áreas lutescentes; cabeça preta (exceto lado dos olhos, jugo, loro, gena e gula que são lutescentes), olhos e antenas pretos.

Pronoto preto, colar (exceto no meio) e duas manchas grandes no disco, atrás dos calos lutescentes, mesoescuto negro, escutelo lutescente.

Hemiélitros pretos, mancha na base do exoclavo e endocório, manchas grandes subapicais no cório lutescentes.

Lado inferior do corpo lutescente, rostró, mesoesterno (exceto lados posteriormente),