

Venezuela, Tachira, 26.VIII.1974, B. Bechy-né; idem, Venezuela, Aragua, Rancho Grande, 1.100 m, 27.III.67, C.J. Rosales e J. Salcedo; idem 20.VIII.49, P. Fenjares, luz; idem, 18.VII.77, luz, J.A. Clavijo; El Parillo, Mi-randa, Venezuela, 6.IX.67, en foliage de du-razno, J. Regerena e P. Semidly, nas coleções mencionada atrás e do autor.

Difere das outras espécies do gênero pela coloração do escutelo e pela morfologia da genitália do macho.

O motivo da inclusão desta espécie no gênero *Matogrossia* Carvalho, 1985 (1984) prendeu-se ao fato de que ela não possuia o segmento I da antena mais longo que a largura da cabeça. Em revisão recente, baseada em aproximadamente 15 espécies do gênero de Distant, 1884 foi possível verificar que o segmento I da antena nesse gênero é praticamente a metade da largura da cabeça. Em *Matogrossia* Carvalho o segmento I havia sido dito como sempre mais longo que a largura da cabeça. A espécie *bahiensis* Carvalho, possui praticamente todos os caracteres de *Motogrossia* e também o segmento I da antena praticamente tão longo quanto a largura da cabeça. A maioria dos exemplares possui uma mancha vermelha longitudinal no escutelo, comissura claval e sutura cório-emboliar da mesma cor ou avermelhadas.

Posantias n.gen.

Deraeocorinae, Deraeocorini. Espécies do complexo *Pseudocarnus* - *Antias* - *Car-melus*, com corpo nitidamente revestido de pubescência fina e erecta, sobretudo no pro-noto e hemiélitros, pronoto distintamente pontuado, sutura cório-emboliar com fileira de pontuações.

Olhos contíguos ao colar, segmento I da antena engrossado (nitidamente mais grosso que os demais), cilíndrico (nunca foliáceo), de comprimento aproximadamente igual a largura do vértice mais a de um olho, segmento II geralmente irregular, com pêlos de comprimento igual ou maior que sua grossura, rostro alcançando as coxas II, membrana muito curta e finamente pilosa.

Espécie tipo de gênero: *Antias lucidus* Berg, 1892

Diferencia-se dos demais do complexo pelos caracteres mencionados acima, devendo ser incluídas no mesmo ainda as seguintes es-pécies: *Deraeocoris dilatatus* Stål, 1860; *Pseudocarnus paulistanus* Carvalho, 1985 (1984); *Pseudocarnus tijucanus* Carvalho, 1985 (1984).

Na chave dos gêneros do complexo mencionado acima integra o mesmo item com *Pseudocarnus* Distant, 1884, que todavia é glabro ao passo que *Posantias* n.gen. é niti-damente piloso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERG, C., 1892, Nova Hemiptera faunarum Argentinae et Uruguayensis. Typ. Pauli E. Coni et Filiorum, Bonariae, 112 p.
- CARVALHO, J.C.M., 1953, Neotropical Miridae, 55: The genus *Eccritotarsus* Stål, with descriptions of fifteen new species (Hemiptera). Ann. Acad. brasili. Ci., 25(4):469-493, 64 Figs.
- CARVALHO, J.C.M., 1958, Catálogo dos Mirídeos do Mundo. Parte II. Subfamília Phyliane. Arq. Mus. Nac. R. Jan., 45:1-216.
- CARVALHO, J.C.M., 1960, Mirídeos Neotropicais, LXXXVIII: Dois novos gêneros do complexo *Neella* Reuter-*Neoneella* Costa Lima (Hemiptera-Heteroptera). Arq. Mus. Nac. R. Jan., 50:47-60, 21 Figs.
- CARVALHO, J.C.M., 1984, Mirídeos Neotropicais, CCXLII: Descrições de oito espécies novas da Amazônia (Hemiptera). Rev. Brasil. Biol., 44(1):99-110, 34 Figs.
- CARVALHO, J.C.M., 1985, Mirídeos Neotropicais, CCL: Gêneros e espécies do complexo *Pseudocarnus*-*Antias*-*Carmelus* (Hemiptera). Rev. Brasil. Biol., 44(3):377-386, 20 Figs. (1984).
- CARVALHO, J.C.M., 1986, Neotropical Miridae, CCLXV: Descriptions of new taxa and taxonomic notes (Heteroptera). J. New York Entomol. Soc. 94(2):205-216, 21 Figs.
- CARVALHO, J.C.M., (na imprensa), Mirídeos Neotropicais, CCCII: Descrições e nota sobre *Resthenini* Reuter (Hemiptera). Rev. Brasil. Biol.
- CARVALHO, J.C.M. and GOMES, I.P., 1971, Mirídeos Neotropicais, CXXIV: Quatro gêneros e dezesseis espécies novas da tribo Bryocorini Douglas and Scott (Hemiptera). An. Acad. brasili. Ci., 43(2):461-478, 56 Figs.
- CARVALHO, J.C.M. and HSIAO, T.Y., 1954, Neotropical Miridae, LXXII: Genus *Neofurius* Distant with descriptions of new species (Hemiptera). Rev. Brasil. Ent., 1:139-149, 7 Figs.
- DISTANT, W.L., 1880-1893, Biologia Centrali Americana. Insecta. Rhynchota. Hemiptera-Heteroptera. vol. I:1-302 (1880-1884); Supplement:304-462 (1884-1893), 29 pls. London.
- LETHIERRY, I., 1881, Liste des Hémiptères recueillis par M. Delauney à la Guadeloupe, La Martinique et Saint-Barthélemy. An. Soc. Ent. Bel., 25:1-12.
- STÅL, C., 1860, Bidrag till Rio de Janeiro-trakterns Hemipter fauna. Ofv. Sv. Kongl. Vet. Akad. Handl., 2(7):45-59.