

INTRODUÇÃO

Reuter, 1907:1-27, descreveu 8 gêneros e 29 espécies novas da Jamaica. Mencionou no texto 2 variedades novas. O trabalho não contém ilustrações, menção do número de exemplares (somente em alguns casos) e tão pouco uma introdução.

Van Duzee, 1907:1-79, apresenta suas notas sobre os Hemiptera da Jamaica, mencionando além dos gêneros, espécies e variedades descritas por Reuter, mais 13 espécies já descritas (mencionadas pelo nome da época). Nesse trabalho afirma que na primavera de 1906 coletou Hemiptera na Jamaica (onde fornece seu itinerário e localidades que visitou). No final de sua introdução diz: "I wish to express here my indebtedness to Dr. O.M. Reuter for his kindness in working up the difficult but interesting Capsids taken by me". Ao relacionar o material colecionado menciona cada espécie (páginas da descrição dos gêneros, espécies e variedades), com a distribuição geográfica, comentários e o número de indivíduos colecionados.

Sem dúvida alguma o material encontra-se na Coleção E.P. Van Duzee, Academia de Ciências da Califórnia, inclusive seus tipos [exceto o lectótipo designado por Henry, 1985:1121 para *Dagbertus olivaceus* (Reuter, 1907) que se encontra em Helsinki]. Para aqueles em que Van Duzee só indicou a existência de um exemplar (holótipos) não resta qualquer dúvida. Para os demais, todavia, a fim de tornar a taxonomia dos mesmos mais firme, o autor designa lectótipos e paralectótipos.

Cabe ainda mencionar a descrição de espécies novas anteriores ou no presente trabalho, originárias do material colecionado por Van Duzee. É muito provável que entre as 13 espécies conhecidas que menciona no seu trabalho existam ainda espécies a serem descritas. Os tipos mencionados acham-se depositados na Coleção E.P. Van Duzee, Academia de Ciências da Califórnia.

O autor é particularmente grato ao colega Paul Arnaud Jr. pelo empréstimo de material para estudo.

Desse material já foram designados por Henry, 1985, como lectótipos as espécies *Lygus olivaceus* Reuter, 1907 e *Sthenarus plebejus* Reuter, 1907.




Fig. 1 - *Baculodema luridum* Reuter, fêmea, holótipo.

Baculodema luridum Reuter, 1907

Baculodema luridum Reuter, 1907:13;

id, Van Duzee, 1907:29;

Falconia luridum Carvalho, 1952:79;

id. 1958:61.

(Fig. 1)

Caracterizada pela coloração do corpo.

Fêmea: comprimento 3,2 mm. largura 0,7 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 0,6 mm, vértice 0,32 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,5 mm; II, 0,8 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,5 mm, largura na base 0,7 mm. **Cúneo:** comprimento 0,12 mm, largura na base 0,04 mm (holótipo).

Coloração geral do corpo castanho-clara (lurida) com áreas pretas; olhos, extrema margem lateral do pronoto e lados do escutelo, pequena mancha na comissura corial pretos.

Lado inferior do corpo castanho-escuro a