



Dagbertus olivaceus (Reuter); Fig. 4 - macho, paralectótipo; Fig. 5 - vésica do edeago; Fig. 6 - parâmero esquerdo; Fig. 7 - parâmero direito.

tótipo de *olivaceus* (Reuter, 1907) da Jamaica, estudando exemplares do Museu de Zoologia de Helsinki e da Academia de Ciências da Califórnia, deixando contudo, de ilustrar sua genitália, o que é feito no presente trabalho.

Dagbertus suspectus (Reuter, 1907)
n. comb. *Lygus suspectus* Reuter, 1907:6;
id, Van Duzee, 1907:31;
id. Carvalho, 1959:129
(Figs. 8-11)

Caracterizada pela coloração do corpo e pela morfologia da genitália do macho.

Macho: comprimento 3,4 mm, largura 1,6 mm. **Cabeça:** comprimento 0,2 mm, largura 1,0 mm, vértice 0,20 mm. **Antena:** segmento I, comprimento 0,3 mm; II, 1,3 mm; III, 0,3 mm; IV, 0,3 mm. **Pronoto:** comprimento 0,6 mm, largura na base 1,2 mm. **Cúneo:** comprimento 0,50 mm, largura na base 0,40 mm (síntipo).

Coloração geral pálido-amarelada a pálida-